

草黄色，无斑纹及横线，后缘区桃红色；后翅黄白色带浅褐色；腹部浅褐色。

雄蛾钩形突长，稍粗，抱器瓣狭长，端部腹缘弧曲，有冠刺，阳茎内囊有一角质窄片，近端部有一几丁质隆起（图 77）。

正模 ♂，山东泰山，1990. VIII. 1。

本种近似矛柔夜蛾，主要区别为前翅前缘无桃红色，雄蛾阳茎内囊无角状器丛。

曙夜蛾属 *Adisura* Moore

Adisura Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 367.

Type-species: *Adisura atkinsoni* Moore.

喙发达，下唇须斜向上伸，下缘饰鳞，额有圆突，下有一角质片，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部毛、鳞混杂，中、后足胫节有少量刺；前翅有一副室；后翅 5 脉细弱，自中室横脉中部发出。

种 检 索 表

- 前翅前、后缘区色暗 曙夜蛾 *Adisura atkinsoni*
- 前翅一色 黄曙夜蛾 *A. straminea*

曙夜蛾 *Adisura atkinsoni* Moore（图版 VII-21）

Adisura atkinsoni Moore, 1861, Proc. zool. Soc. Lond. p. 368, pl. 37, fig. 6. (大吉岭)

Adisura leucanioides Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 368.

Adisura pallida Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 369.

Adisura atkinsoni Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 120, text fig. 39.

Adisura atkinsoni: Hampson, 1894, Fn. Br. t. Ind. 2: 173. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 249, pl. 51a. —Warren, 1913, in Seitz, Macrole. 11: 315, pl. 28f. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 280, pl. 85, fig. 1997. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 956.

翅展 28 mm 左右。头部及胸部灰褐色，下唇须及足外侧褐黄色；前翅淡黄灰色，前缘带有桃红色，后缘区较宽红褐色，端区带有桃红色及褐色，内线只现几个黑点，外线为一系列黑点，排列约呈外弯的弧形，环纹及肾纹隐约可见，色暗灰；后翅淡黄色微带褐色，翅脉暗褐色；腹部黄褐色。

分布 江苏、湖北、湖南、四川；锡金。

黄曙夜蛾 *Adisura straminea* Hampson（图版 VII-22）

Adisura straminea Hampson, 1902, Ann. S. Afr. Mus. 2: 258. (博茨瓦纳)