

色，自前缘脉微曲外斜，至4脉后折向内弯，在亚中褶处较明显内凸，在前缘区较粗，其余间断为点列，亚端线白色，在前缘区为粗内斜点，其后为3个白色斜纹，后一纹长，外伸近翅外缘，线后半微弱，间断，稍内弯，翅外缘有一列白点；后翅褐色，横脉纹为一新月形白点，外线白色，细锯齿形，中段稍外突，亚端线白色，曲度与外线略似，不规则锯齿形，有间断，中褶前不明显，翅外缘有一列白点；腹部褐色。

雄蛾抱器瓣端宽，背端成一角（图680）。

幼虫取食枯叶。

分布 浙江、湖北、福建、海南、四川；日本。

断线疔夜蛾 *Adrapsa incertalis* Leech (图版 LXVII-8)

Adrapsa incertalis Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 615. (峨眉山)

Adrapsa? incertalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 422, pl. 74k.

翅展47 mm。头部与胸部黑褐色；前翅暗褐色，内线黑褐色，微波浪形外弯，线内方色近黑褐，环纹只现一白点，肾纹为一细窄白纹，中线粗，褐黑色，外弯约呈弧形，外线微白，自前缘脉微曲外斜，至5脉折角内弯，亚端线间断为一列白点，外线与亚端线间黑褐色，成一弯曲宽带，端线黑色；后翅暗褐色，中线粗，黑褐色，外线白色外弯，亚端线由一列白点组成，外线与亚端线间黑褐色成一曲带，端线黑色；腹部暗褐色。

分布 湖北、四川。

手头为一雌性，亚端线前半较完整。

双锯疔夜蛾 *Adrapsa rivulata* Leech (图版 LXVII-9)

Adrapsa rivulata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 615. (峨眉山)

Adrapsa rivulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 422, pl. 74k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 382. —Chen, et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.369, pl. 25, fig. 22.

翅展30 mm。头部黑棕色，杂有少许褐黄色，下唇须第二节与第三节端部白色；胸部黑棕色，颈板杂有少许褐黄色，足胫节端部白色，胫距基部与端部白色，跗节各节间有白斑；前翅黑棕色，环纹只现一小白点，肾纹为椭圆形白点，外线白色，锯齿形，自前缘脉外弯，在中褶处内凹，4脉后内弯，亚端线白色，在7脉稍外凸，其后曲度与外线相似，缘毛基部黑色间白色；后翅黑棕色，外线白色，细锯齿形，中段明显外弯，亚端线白色，细锯齿形外弯，稍有间断；腹部黑棕色。

分布 四川、西藏。

白肾疔夜蛾 *Adrapsa albirenalis* (Moore) (图版 LXVII-10)

Herminia? albirenalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 85. (大吉岭)

Adrapsa albirenalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 38, fig. 17. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 382.

翅展 30 mm。头部黑棕色，雄蛾触角线形，有纤毛丛，下唇须第二节斜向上伸，基部下缘和端部上缘有毛簇；胸部黑棕色，足褐黑色杂少许蓝白色，跗节各节间有蓝白斑；前翅黑棕色，前缘区及外区布有白色细点，环纹只现一白点，肾纹白色，窄长，外线白色，微波曲，自前缘脉外斜至 4 脉折向内斜，亚端线白色，前半微锯齿形，后半弱而间断，翅外缘近顶角有一白斑；后翅黑棕色，基部及前缘区褐白色，翅外半、亚中褶及后缘区布有白色细点，外线与亚端线白色，折角于中部；腹部黑棕色，臀毛簇黄褐色。

分布 云南；锡金，印度。

鬃角夜蛾属 *Apladrapsa* Warren

Apladrapsa Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423.

Type-species: *Adrapsa ochracea* Leech.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，第三节短，雄蛾触角线形，有长鬃毛，触角干较直；胸部与腹部被平滑鳞片，足胫节饰毛；前翅较长，有一副室；后翅中室短，约为翅长之 1/3，6、7 脉共柄。

鬃角夜蛾 *Apladrapsa ochracea* (Leech) (图版 LXVII-11)

Adrapsa ochracea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 614. (湖北宜昌, Moupin)

Apladrapsa ochracea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 423, pl. 741.

翅展 36 mm。头部与胸部淡褐色，下唇须外侧、下胸及足杂有黑褐色；前翅淡赭黄色，布有黑褐细点，外线外方除端区前半外带黑褐色，内线暗灰褐色，模糊，有间断，环纹小，白色，有不完整的黑褐边，中线粗而模糊，黑褐色，在中室处近呈一方形斑，后半稍内斜，肾纹白色，黑褐边，外线双线黑褐色，细锯齿形，自前缘脉后外弯，在中褶处稍内凸，至 4 脉后内斜，亚端线不规则波曲，在 7 脉处外凸，在中褶处明显内凸，其后不显，1 脉后隐约可见，翅外缘有一列近三角形黑褐色，顶角有一黑褐纹，缘毛基部浅赭黄色，端部黑褐色；后翅浅赭黄色，内中区有一黑褐色窄带，较直内斜，其内方带有暗褐色，外线双线黑褐色，细锯齿形，自前缘外斜至 3 脉折角内斜，外线外方带有暗褐色，亚端线在暗褐区中现浅赭黄色，不规则锯齿形，端线黑褐色，由新月形纹组成，缘毛端半部黑褐色；腹部灰褐色。

分布 湖北。