

Type-species: *Poecilogramma picatum* Butler.

Poecilogramma Butler, 1892, Proc. zool. Soc. p. 126.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节中常；额平滑，无突起；复眼大，圆形；雄蛾触角有长纤毛。胸部被鳞片为主，前、后胸有由长匙形毛组成的散开形毛簇；中足胫节外侧饰长毛，后足胫节饰毛中常。腹部基节背面有毛簇。前翅稍窄而长，顶角较尖，外缘曲度平稳，有一副室。

秋意夜蛾 *Aelogramma bellissima* (Draudt) (图版 XXXIII-28)

Poecilogramma bellissima Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 108, pl. 7, fig. 15. (云南丽江)

Aelogramma bellissima: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.265.

翅展 31 mm。头、胸黑褐杂少许白色；前翅黑色，各横线白色，基线、外线锯齿形，内线在中室前后缘各成一外突齿，线后半内侧带绿色，环纹黑色白边，肾纹前后端为白边的黑点，后一点尖而内突，环纹、肾纹有一绿条，外线内侧衬黑色并有一绿色窄带，亚端线外侧衬绿色，后端与外线相合，翅外缘一列白纹；后翅与腹部灰褐色。

分布 云南、西藏。

毛足夜蛾属 *Pseuderioopus* Warren

Pseuderioopus Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 169.

Type-species: *Zurobata albiscripta* Hampson.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，1/3 处折曲，其上缘有毛丛；胸部主要被鳞片，前、后胸有散开形毛簇，由长勺状鳞组成，雄蛾前足腿节有浓毛簇，前足胫节端部有毛束，中足胫节有长毛；前翅窄长，有一副室；后翅 5 脉弱，腹基节有毛簇。

毛足夜蛾 *Pseuderioopus albiscripta* (Hampson) (图版 XXXIII-31)

Zurobata albiscripta Hampson, 1898, J. Bomb. Nat. Hist. Soc. 11: 449. (印度)

Agabra spotha Swinhoe, 1900, Cat. Het. Mus. Oxon 2: 37, pl. 1, fig. 6.

Poecilogramma albiscripta: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 515, text fig. 244. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 108.

Pseuderioopus albiscripta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 169, pl. 19g. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 787.

翅展 24 mm。头部与颈板褐色杂黄白色，胸部白色杂褐毛，下胸与足黄白色，前足腿节有黑毛簇；前翅黄褐色，中部有一近三角形大褐斑，其前端达中室，后端达翅后