



图 102 浦地夜蛾 *Agrotis ripae* (Hubner) ♂ 外生殖器

奇地夜蛾 *Agrotis eugramma* Hampson (图版 IX-1)

Agrotis eugramma Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 432, pl. 71, fig. 11. (四川康定)

Feltia miranda Corti, 1928, Mitt. munch. ent. Ges. 18: 13, fig. 3.

Rhyacia eugramma: Warren, 1909, in Seltz, Macrolep. World 3: 47, pl. 10g.

Agrotis eugramma: Corti, 1933, in Seltz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 50.

翅展 35 mm。头部与胸部暗褐色，鳞、毛端部灰色；前翅黄褐色带有黑棕色，基线仅在前缘区及中室可见黑色粗点状，内线双线黑色，外一线粗，微波浪形外斜，剑纹小，褐色黑边，环纹圆形，浅褐色，黑边，肾纹黑棕色，黑边，中线模糊，暗褐色，仅中室后方可见，外线双线黑色，细锯齿形，外一线弱，自前缘脉后外弯，至 4 脉后内斜，亚端线黄灰色，稍有间断，外凸于 7 脉，2—5 脉间外弯，内侧有一列锯齿形黑纹，端线由一系列黑点组成；后翅浅赭黄色微带褐色，隐约可见褐色外线，端线褐色，缘毛黄白色，中有一褐线腹部暗赭黄色杂有灰色。

分布 四川。

褐地夜蛾 *Agrotis indiana* Guenée (图版 IX-2)

Agrotis indiana Guenée, 1852, in Boisduval & Guenée, Noct, i: 302, (Indes Orientalis)

Tiracola violacea Butler, 1889, Ill. Het. 7: 54.

Hypernaenia violacea: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 196.

Mythimna indiana: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 608.

Orthosia indiana: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World, 3: 61. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 64.

Mesogona indiana: Chen, 1982, Econ. Het. Sin. 3: 286. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.200.

翅展 55 mm。头部与胸部暗棕色；腹部暗灰棕色；前翅暗棕色，布有零星白点，内线细，黑色，波浪形外斜，环纹微斜，黑边，肾纹色深，黑色，中线模糊，在肾纹后折向内斜，外线黑色，锯齿形，亚端线色较深，锯齿形；后翅烟褐色。

分布 四川；印度。

狼夜蛾属 *Ochropleura* Hübner

Ochropleura Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 223.

Type-species: *Phalaena plecta* Linnaeus.

Hapalia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 220.

Ogygia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 225.

Actebia Stephens, 1829, Nom. Brit. Ins. p. 41.

Actobia Agassiz, [1847] 1847, Non. zool. Ind. Univ. p. 6.

Dichagyris Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 206.

Phleboeis Christoph, 1887, Ent. Ver. Stett. 48: 164.

Phlebois Spuler, 1905, Schmett. Eur. p. 166.

Stenosoma Turati, 1924, Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Storia nat. Milano 62: 74.

Stenosomides Strand, 1942, Folia Zool. Hydr. 11: 390.

Yigoga Nye, 1975, Gen. Names Moths World 1: 508.

喙发达，下唇须向前或斜向上伸，额光滑或中部有突起，雄蛾触角线形、锯齿形或双栉形，各足胫节均具刺，前足稍长于跗基节，雄蛾外生殖器的抱器瓣窄，有冠刺，但不很发达，或有无冠刺的种类，抱钩较小，微弯。

种 检 索 表

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. 前翅带绿色 | 2 |
| 前翅不带绿色 | 3 |
| 2. 环、肾纹中央有红点 | 翠色狼夜蛾 <i>Ochropleura praecox</i> |
| 环、肾纹中央有黑点 | 黑齿狼夜蛾 <i>O. praecurrens</i> |
| 3. 环纹窄扁 | 4 |
| 环纹中常 | 6 |
| 4. 抱器内突长 | 摄狼夜蛾 <i>O. perturbens</i> |
| 抱器内突短 | 5 |