

缘灰黑色，基线黑色波曲，自前缘脉至1脉，双线，线间灰白色，内线双线黑色，线间灰白色，波曲外斜，剑纹明显，褐色黑边，环纹圆形，中有褐纹，褐边，肾纹大，中有一褐黑纹，黑边，外线褐色，自前缘脉后外弯，5脉后波曲内斜，亚端线灰白色，不明显，在7脉处外凸，2—5脉间外弯，端线黑色，内侧在4—6脉间有一内凸的褐斑，缘毛基部灰黄色；后翅灰白色；腹部灰褐色。

分布 青海、西藏。

西地夜蛾 *Agrotis plana* Leech (图版Ⅷ-27)

Agrotis plana Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 26. (中国: Pu-tsu-fong, 峨眉山; Nitou)

Rhyacia plana: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 38, pl. 8c.

Agrotis plana: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 371, pl. 68, fig. 30.

翅展30 mm。头部红褐色杂有灰色及黑色，下唇须外侧黑色；胸部背面黑褐色，鳞、毛端部灰色，颈板红褐色杂有灰色及黑色，中部有一黑横线，布有少许白细点，足跗节各节间有白斑；前翅暗褐色带有紫灰色，基线不明显，黑色波曲，自前缘脉至1脉，在中室前缘成一外凸角，内线黑色，在中室前缘及亚中褶处外凸成齿形，在1脉处内凸，环纹大，圆形，褐灰色，中有黑圆斑，外围黑色，肾纹大，色似环纹，但中有黑曲纹，外线黑色，细锯齿形，自前缘脉后外弯至4脉后内斜，在亚中褶处内凸，亚端线隐约可见，浅褐色，波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅浅褐色；腹部赭褐色，腹面色暗，布有白色细点。

分布 四川、云南。

警纹地夜蛾 *Agrotis exclamationis* (Linnaeus) (图版Ⅷ-28)

Phalaena Noctua exclamationis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. Edn. 10 (1): 515. (欧洲)

Phalaena clavus Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (3): 298.

Agrotis informis Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 500.

Agrotis exclamationis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 688. —Chen, 1986, Cutworms Agric. reg. China p.37.

翅展39 mm。头、胸灰色；前翅灰褐色，布有细黑点，前缘区黑点致密，基线黑褐色，内、外线暗褐色，剑纹长舌形，环纹外端尖，肾纹短肥，中线褐色模糊，亚端线浅黄色锯齿形，端区色暗；后翅白色带褐；腹部灰色，雄蛾抱钩棘状，阴茎无角状器，端部一具齿纵脊(图101)。

分布 内蒙古、青海、新疆、云南、西藏；欧洲。

杂地夜蛾 *Agrotis submolesta* Püngeler (图版Ⅷ-29)

Agrotis submolesta Püngeler, (1900) 1899, Iris, 12: 291, pl. 8, fig. 14. (青海湖)

Euxoa submolesta: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 215. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 28.

Rhyacia submolesta: Corti, 1932, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 73.

翅展 43 mm。头部与胸部灰色杂褐色，颈板中部有一黑色横线；前翅灰褐色，基线双线黑色，波浪形，内线双线黑色，内一线细，波浪形微外斜，剑纹小，黑边，环纹圆形，黑边，肾纹短宽，黑边，中有一曲纹，环、肾纹之间有一黑短纹，外线双线黑色，外一线弱，细锯齿形，亚端线不明显，浅褐色，内侧有一列黑齿纹，端线黑色；后翅浅褐色，端区色较深，腹部褐色。

分布 青海。




图 101 警纹地夜蛾 *Agrotis exclamatoris* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

浦地夜蛾 *Agrotis ripae* (Hübner) (图版 VIII-30)

Noctua ripae Hübner, [1823], Samml. Eur. Schmett. 4: pl. 151, figs. 702—703. (欧洲)

Feltia fuscifusa Hampson, 1919, Trans. ent. Soc. Lond. p. 432.

Agrotis ripae: Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 50. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.45.

翅展 30 mm。头、胸及前翅浅褐色，前翅带黄色，翅脉纹白色，基线、中线及外线黑色，亚端线白色，内线双线黑色，剑纹舌形，环、肾纹浅黄褐色黑边，亚端线内侧有一列楔形黑斑，外侧微黑；后翅白色；腹部赭黄色。雄蛾抱钩细而短，阳茎端部有一具齿纵脊（图 102）。

寄主 倒提壶、猪毛菜等属。

分布 内蒙古、新疆、西藏；蒙古，欧洲。