

翅展 36 mm。头、胸、前翅浅赭黄色，后者微带赤褐色，中室偏红，内线褐色波浪形，环、肾纹黄色，后者后端白色并微内突，外线褐色锯齿形，亚端线褐色；后翅赭黄带褐色；腹部褐色。雄蛾腹部基部两侧各一黑毛簇。雄蛾抱器瓣腹缘强拱，阳茎有一棘形角状器（图 399）。

分布 黑龙江、江苏、浙江、湖南、福建、江西、云南；日本，朝鲜，印度，俄罗斯。

白边研夜蛾 *Aletia albomarginata* (Wileman et South) (图版XXII-9)

Cirphis albomarginata Wileman et South, 1920, Entomologist, 53: 122. (菲律宾)

Cirphis albomarginalis Wileman et West, 1928, Entomologist's Rec. J. Var. 40: 139.

Aletia albomarginata: Calora, 1966, Philipp. Agric. 50: 696, fig. 6.

翅展 33 mm。头、胸、前翅乳黄色。前翅各横线不显，环纹只现模糊微黄斑，其中有黑褐点，肾纹只现几个褐纹，外区有几个黑点，顶角有一黄白斜纹，内侧微带褐色，外侧成一模糊褐斜线至翅后缘，后端有少数密集的黑褐点；后翅黑褐色，前缘区黄白；腹部浅褐黄色。雄蛾抱器瓣腹缘强拱突，阳茎稍短（图 400）。




图 400 白边研夜蛾 *Aletia albomarginata* (Wileman et South) ♂外生殖器

分布 海南；菲律宾，印度尼西亚。

旷研夜蛾 *Aletia inornata* (Leech) (图版XXII-10)

Leucania flavostigma var. *inornata* Leech, 1889, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 482, (日本)

Cirphis inornata: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 510.

Hyphilare inornata: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 96.