

柔研夜蛾 *Aletia placida* (Butler) (图版XXII-19)

Mythimna placida Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (2): 79. (日本横滨)

Leucania placida: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 131. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 309.

Aletia placida: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 714.

翅展 39—41 mm。头、胸、前翅浅赭色，前翅散布黑色细点，内线为各脉上的黑点组成，肾纹隐约可见，“8”字形，外侧褐色，后半有一黑点，外线为各脉上的黑点组成，后半内斜，端线为一列黑点，顶角有一内斜暗影；后翅烟褐色；腹部褐色。雄蛾抱器瓣腹侧强拱突，冠小，有极长柄（图 409）。




图 409 柔研夜蛾 *Aletia placida* (Butler) ♂ 外生殖器

分布 江苏、浙江、湖北、广西、海南、四川；日本，朝鲜。

角线研夜蛾 *Aletia conigera* (Denis et Schiffermüller) (图版XXII-20)

Noctua conigera [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 84. (奥地利)

Sideridis conigera: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 96. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303.

翅展 31—33 mm。头、胸、前翅黄色带红褐色，翅脉微黑，内线红棕色，环纹黄色，肾纹白色，中有一黄斑，后端内突，外侧微黑，亚端线黑棕色；后翅赭黄，端区带有褐色；腹部褐色。雄蛾抱器瓣腹侧拱，冠有长柄（图 410）。

分布 黑龙江、内蒙古、河北、山西；欧洲。