

贫冬夜蛾属 *Allophyes* Tams

Allophyes Tams, 1942, Entomologist. 75: 209.

Type-species: *Phalaena Noctua oxyacantheae* Linnaeus.

Miselia Boisduval, 1829, Ind. Meth. p. 73.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节较短，额光滑，复眼大，雄蛾触角双栉形，栉齿短，雌蛾锯齿形；胸部主要被鳞，前、后胸有毛簇；腹部基部几节有毛簇；前翅较宽，有一副室；后翅5脉细弱。

白背贫冬夜蛾 *Allophyes albithorax* (Draudt) (图版XXIV-31)

Meganephria albithorax Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 66, pl. 4, fig. 24. (湖南衡山，云南丽江)

Allophyes albithorax: Boursin, 1953, Mitt. munch. ent. Ges. 43: 239.

Meganephria albithorax: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 315. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 970.

翅展45mm。头部褐色；胸部背面白色，颈板基部褐色，中部有一黑横纹，端半部白色；前翅褐色，端区灰色，前缘脉基部后方有一黑纹，亚中褶有一黑色纵纹，自翅基部伸达外缘，中段向后凸成齿形，后衬白色，基部较渗散，内线细，黑色，环纹大，有细黑边线，肾纹大，黑边，有一黑线外伸至外区，外线细，黑色，自前缘脉后外斜弯，至6脉后波浪形内斜，亚端线白色，前端内侧有黑褐斜纹伸至外线，其中有二黑线，端区3—4脉间及2—3脉间各有一楔形黑纹；后翅灰褐色；腹部褐色，毛簇黑色。

分布 湖南、江西、云南。

明冬夜蛾属 *Lamprosticta* Hübner

Lamprosticta Hübner, [1820] 1816, Verz, bek. Schmett. p. 207.

Type-species: *Noctua culta* [Denis et Schiffermüller].

Chariptera Guenée, 1838, Ann. Soc. ent. Fr. 7: 124.

喙发达，下唇须短，向上伸，额平滑，无突起，眼大，圆形，雄蛾触角多为线形；头部与胸部被粗鳞为主，前、后胸有散开形毛簇，下胸有长毛，足胫节密被鳞片；腹部背面有一列毛簇；前翅较短宽，顶角约呈直角形，外线曲度平稳，有一副室。

洁明冬夜蛾 *Lamprosticta munda* (Leech) (图版XXIV-32)

Eurois munda Leech, 1900. Trans. ent. Soc. Lond. p. 92. (康定)