

色；后翅褐色；腹部灰褐色。

寄主 蒲公英等。

分布 黑龙江、新疆、河南、江苏、湖北、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，欧洲。

丝杂夜蛾 *Amphipyra sergei* (Staudinger) (图版 XXVII-22)

Acosmetia alpherakii var. *sergei* Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 31; (新疆伊宁)

Amphipyra sergei: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 40. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 23.

翅展 38mm。头、胸黄白杂黑褐色；前翅灰白，密布黑褐细点，端区黄白色，中室基部一黑纵条，基线黄白色，内线双线黑色，线间黄白色，剑纹可见黑边，环纹扁，黑色黄白边，肾纹窄长中凹，黑色，黄白边，中、外线黑色，亚端线锯齿形；后翅与腹部黄白带褐色。

分布 新疆；中亚地区。

阴杂夜蛾 *Amphipyra cancellata* Warren (图版 XXVII-23)

Amphipyra cancellata Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 160, pl. 38e. (上库曼)

Amphipyra alpheraci ab. *cancellata*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 39.

翅展 36mm。头部浅赭黄色杂暗褐色，下唇须第二节外侧杂有黑褐色；胸部背面浅赭黄色杂有少许暗褐色，颈板端半部杂有黑褐色；前翅灰褐色，亚端线内侧及中室带有黑褐色，外侧黄白色，外区各翅脉黄白色，基线黑褐色，有间断，在前缘区及中室后较显，内线不明显，黑褐色，波浪形，环纹与肾纹浅赭黄色边，外线黑褐色，外侧衬黄白色，在 4—8 脉间为外曲弧形，外区前缘脉上有 3 个内斜黄白纹，亚端线黄白色，自前缘脉内斜至 8 脉，折角微外弯，翅外缘有一列黑点，缘毛黄白色，基半部带有赭黄色，中部有一黑色波浪形粗线；后翅黄灰色微带褐色，端区色较暗，缘毛灰黄色；腹部灰褐色。

分布 新疆；中亚地区。

宁杂夜蛾 *Amphipyra alpherakii* (Staudinger) (图版 XXVII-24)

Acosmetia? *alpherakii* Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 30. (伊犁地区)

Amphipyra alpheraci Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 39.

Amphipyra alpherakii: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 160.

翅展 30—36mm。头部与胸部白色微带褐色，足跗节外侧带暗褐色，各节间有白斑；前翅灰白色带有褐色，基线暗褐色，仅在前缘区及中室后较显，内线暗褐色，不清

晰，在前缘区较粗，其后波浪形，环纹不显，肾纹为一浅赭黄新月形圈，外线深褐色，外侧衬以黄白色，自前缘脉外斜伸至8脉，其后外弯，至4脉后内弯，外区前缘脉上有一列黄白点，亚端线白色，自前缘脉内斜至7脉，折角微外弯，至3脉后内弯，翅外缘有一列黑褐点，缘毛黄白色带褐色，基部有一赭黄线；后翅黄白色带赤褐色，缘毛白色，基部带有赤褐色；腹部黄白色带褐色。

分布 新疆；中亚地区。

桦杂夜蛾 *Amphipyra schrenkii* Ménériés (图版 XXVII-25)

Amphipyra schrenkii Ménériés, 1859, Bull. Ac. Petr. Men. 17: 219. (Amur, Kisi; Sarachanda)

Amphipyra schrenkii: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 159. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 252.

翅展 52—68mm。头、胸灰褐色，前翅黑褐色，基线、内线、中线及外线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，环纹为一白点，肾纹小，内缘一白纹，外线外侧衬灰白色，亚端线不明显，微白，前端外侧一大白斑，其中有褐点；后翅褐灰至暗褐色；腹部暗灰色。

寄主 棘皮桦。

分布 黑龙江、陕西、河南、湖北；日本，朝鲜。

潮杂夜蛾 *Amphipyra subrigua* Bremer et Grey (图版 XXVII-26)

Amphipyra subrigua Bremer et Grey, 1853, Beitr. Schmett.-fn. N. China, p. 17. (北京)

Amphipyra subrigua: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 37. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 86. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 770.

翅展 41mm。头、胸黑褐色；前翅暗褐色，大部带灰色，基线、内线及外线黑色，后者间断为点列，外侧衬黄灰色，中线黑色，仅前段可见，环纹小，中央微白，肾纹不显，亚端线灰白色，间断为点列；后翅灰色带褐，端区黑褐色；腹部暗红褐色。

分布 河北、四川；日本。

流杂夜蛾 *Amphipyra acheron* Draudt (图版 XXVII-27)

Amphipyra acheron Draudt, 1950, Mitt. nunch. ent. Ges. 40: 84, pl. 6, fig. 5. (云南丽江，太白山)

Amphipyra acheron Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.237. pl. 14, fig. 1.

翅展 58mm。头部与胸部黑褐色带灰色；前翅暗褐色，隐约可见基线，内线的前端，呈黑褐色，外线微白色，中段外弯，其内方为隐约的黑褐色宽带，亚端线前段隐约可见黑褐色；后翅暗褐色。