

分布 陕西、云南、西藏。

冥杂夜蛾 *Amphipyra charon* Draudt (图版 XXVII-28)

Amphipyra charon Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 85, pl. 6, fig. 6. (湖南衡山)

Amphipyra charon: Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.974.

翅展 49mm。头部及胸部黑褐色；前翅黑褐色，基线与内线黑色，后者双线，深波浪形，线间褐色，环纹小，褐色，肾纹不清晰，外线双线黑色，外一线弱，不规则细波浪形。在 4 脉处折角，线间浅褐色，亚端线浅褐色，大波曲，在中褶处内凸，前端内侧有一黑褐色大斑，中褶自环纹至外线带黑色，似一纵条；后翅黑褐色；腹部黑褐色。

分布 湖南。

莫夜蛾属 *Mormo* Ochsenheimer

Mormo Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 80.

Type-species: *Phalaena maura* Linnaeus.

Lemur Hübner, 1822, Syst. Alph. Verz. p. 23.

Mania Treitschke, 1825, Schmett. Eur. 5: 294.

Acyra Gistel, 1848, Natur. Thier. Schul.: X.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，额平滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部被毛和鳞片，前、中、后胸均有分裂形毛簇；腹部被粗毛，背面有一列毛簇，侧面饰毛；前翅宽，外缘曲度平稳，缘毛波浪形，有一副室；后翅 5 脉微弱，外缘毛波浪形。

种 检 索 表

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. 前翅中区带黑色，后缘有浅纹 | 2 |
| 前翅一色，后缘无浅纹 | 3 |
| 2. 前翅外线后半斜波浪形 | 黑带莫夜蛾 <i>Mormo muscivens</i> |
| 前翅外线后半内弯 | 脉莫夜蛾 <i>M. venusta</i> |
| 3. 前翅外线后段直 | 黄褐莫夜蛾 <i>M. nyctichroa</i> |
| 前翅外线后段波曲 | 暗莫夜蛾 <i>M. phaechroa</i> |

黑带莫夜蛾 *Mormo muscivirens* Butler (图版 XXVII-29)

Mormo muscivirens Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 289. (日本)

Mania muscivirens: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 51. —Warren. 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 162.