

Amphipyra corvina Motschulsky, 1866, Bull. Mosc. 39: 194.

Amphipyra livida: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 31. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展45mm左右。头部、胸部及前翅紫黑色，头顶有黄褐色，足有白点；后翅粉黄色微带褐色，端区带有暗红色，顶角带棕黑色，外缘毛在2脉之前紫黑色。

寄主 蒲公英及其他矮小植物。

分布 黑龙江、新疆、河南、江苏、湖北、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，欧洲等。

大红裙杂夜蛾 *Amphipyra monolitha* Guenée (图版 XXVII-17)

Amphipyra monolitha Guenée, 1852, in Boisduval *et* Guenée, Hist. Nat. Ins. Noct. 2: 414. (Bengal)

Amphipyra monolitha: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 28. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 769. —Chen, 1982, Het. Icon. For. Ins. 3: 251.

翅展56—63mm。头、胸黑棕杂褐色；前翅紫棕色，基线双线黑色波浪形，内线、外线均双线黑色锯齿形，后者齿尖有白点，中线模糊暗褐色，中室有一暗褐纹，环纹为赭白环，肾纹不显，亚端线为一列黄白点，内侧有一列黑齿纹，外侧有一列暗褐纹；后翅红褐色；腹部紫棕色。

分布 黑龙江、辽宁、河北、河南、湖北、江西、福建、广东、四川、云南；日本，印度，欧洲。

果红裙杂夜蛾 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus) (图版 XXVII-18)

Phalaena Noctua pyramidea Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 518. (德国)




图 449 果红裙杂夜蛾 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus) ♂ 外生殖器