

Amphipyra pyramidea: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 28. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48—50mm。头、胸棕褐色；前翅暗赭微带紫色，基线、内线及外线均双线黑色，内线、外线锯齿形，环纹为一白环，外线齿尖为白点，亚端线灰黄，内侧衬黑棕色；后翅红赭色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣简单，无附件（图 449）。

寄主 栎、枫、榆、杨、柳、榛、胡桃、接骨木、乌荆子、桦、桃、梨、苹果、葡萄、樱桃等。

分布 黑龙江、河北、湖北、江西、广东、四川；日本，印度，伊朗，欧洲。

匀杂夜蛾 *Amphipyra tripartita* Butler (图版 XXVII-19)

Amphipyra tripartita Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 288. (日本)

Amphipyra tripartita: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 32. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 23.

翅展 55mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅 1 脉基部前方一小白点，基线仅前端现一白纹，内线、外线及亚端线白色，后者锯齿形并间断，中段内方赭褐色，外方一列黑纵纹；后翅暗褐带黑灰，端区色浓；腹部灰褐色。

分布 湖北、四川；日本，朝鲜。

暗杂夜蛾 *Amphipyra erebina* Butler (图版 XXVII-20)

Amphipyra erebina Butler, 1878, Ann. Mag. ent. Hist. 5 (1): 287. (日本)

Amphipyra erebina: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 33. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 41—52mm。头、胸及翅褐色，前翅色稍浅，中区外半带有黑褐色，端区布有灰白细点，基线、内线均双线黑褐色波浪形，中线模糊黑褐色，外线黑棕色，外侧衬赭黄，波浪形，亚端线微白，内侧衬暗褐色，前段稍扩展，环纹小，有白环，肾纹不显；后翅褐色；腹部暗灰褐色。

分布 黑龙江、湖北、云南；日本，朝鲜。

蔷薇杂夜蛾 *Amphipyra perflua* (Fabricius) (图版 XXVII-21)

Noctua perflua Fabricius, 1787, Mant. Ins. 2: 179. (奥地利)

Amphipyra perflua: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 34. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48mm。头、胸及前翅黑棕色，前翅外区浅褐色，端区色浅，内区有赭黄点，各横线浅褐色，内线波浪形，外线、亚端线锯齿形，环纹扁而斜，无肾纹，翅脉纹暗褐

色；后翅褐色；腹部灰褐色。

寄主 蒲公英等。

分布 黑龙江、新疆、河南、江苏、湖北、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，欧洲。

丝杂夜蛾 *Amphipyra sergei* (Staudinger) (图版 XXVII-22)

Acosmetia alpherakii var. *sergei* Staudinger, 1888, Stett, ent. Z. p. 31; (新疆伊宁)

Amphipyra sergei: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 40. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 23.

翅展 38mm。头、胸黄白杂黑褐色；前翅灰白，密布黑褐细点，端区黄白色，中室基部一黑纵条，基线黄白色，内线双线黑色，线间黄白色，剑纹可见黑边，环纹扁，黑色黄白边，肾纹窄长中凹，黑色，黄白边，中、外线黑色，亚端线锯齿形；后翅与腹部黄白带褐色。

分布 新疆；中亚地区。

阴杂夜蛾 *Amphipyra cancellata* Warren (图版 XXVII-23)

Amphipyra cancellata Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 160, pl. 38e. (上库曼)

Amphipyra alpheraci ab. *cancellata*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 39.

翅展 36mm。头部浅赭黄色杂暗褐色，下唇须第二节外侧杂有黑褐色；胸部背面浅赭黄色杂有少许暗褐色，颈板端半部杂有黑褐色；前翅灰褐色，亚端线内侧及中室带有黑褐色，外侧黄白色，外区各翅脉黄白色，基线黑褐色，有间断，在前缘区及中室后较显，内线不明显，黑褐色，波浪形，环纹与肾纹浅赭黄色边，外线黑褐色，外侧衬黄白色，在 4—8 脉间为外曲弧形，外区前缘脉上有 3 个内斜黄白纹，亚端线黄白色，自前缘脉内斜至 8 脉，折角微外弯，翅外缘有一列黑点，缘毛黄白色，基半部带有赭黄色，中部有一黑色波浪形粗线；后翅黄灰色微带褐色，端区色较暗，缘毛灰黄色；腹部灰褐色。

分布 新疆；中亚地区。

宁杂夜蛾 *Amphipyra alpherakii* (Staudinger) (图版 XXVII-24)

Acosmetia? *alpherakii* Staudinger, 1888, Stett, ent. Zeit. p. 30. (伊犁地区)

Amphipyra alpheraci Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 39.

Amphipyra alpherakii: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 160.

翅展 30—36mm。头部与胸部白色微带褐色，足跗节外侧带暗褐色，各节间有白斑；前翅灰白色带有褐色，基线暗褐色，仅在前缘区及中室后较显，内线暗褐色，不清