

*Amphipyra corvina* Motschulsky, 1866, Bull. Mosc. 39: 194.

*Amphipyra livida*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 31. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展45mm左右。头部、胸部及前翅紫黑色，头顶有黄褐色，足有白点；后翅粉黄色微带褐色，端区带有暗红色，顶角带棕黑色，外缘毛在2脉之前紫黑色。

**寄主** 蒲公英及其他矮小植物。

**分布** 黑龙江、新疆、河南、江苏、湖北、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，欧洲等。

### 大红裙杂夜蛾 *Amphipyra monolitha* Guenée (图版 XXVII-17)

*Amphipyra monolitha* Guenée, 1852, in Boisduval *et* Guenée, Hist. Nat. Ins. Noct. 2: 414. (Bengal)

*Amphipyra monolitha*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 28. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 769. —Chen, 1982, Het. Icon. For. Ins. 3: 251.

翅展56—63mm。头、胸黑棕杂褐色；前翅紫棕色，基线双线黑色波浪形，内线、外线均双线黑色锯齿形，后者齿尖有白点，中线模糊暗褐色，中室有一暗褐纹，环纹为赭白环，肾纹不显，亚端线为一列黄白点，内侧有一列黑齿纹，外侧有一列暗褐纹；后翅红褐色；腹部紫棕色。

**分布** 黑龙江、辽宁、河北、河南、湖北、江西、福建、广东、四川、云南；日本，印度，欧洲。

### 果红裙杂夜蛾 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus) (图版 XXVII-18)

*Phalaena Noctua pyramidea* Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 518. (德国)




图 449 果红裙杂夜蛾 *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

*Amphipyra pyramidea*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 28. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48—50mm。头、胸棕褐色；前翅暗赭微带紫色，基线、内线及外线均双线黑色，内线、外线锯齿形，环纹为一白环，外线齿尖为白点，亚端线灰黄，内侧衬黑棕色；后翅红赭色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣简单，无附件（图 449）。

**寄主** 栎、枫、榆、杨、柳、榛、胡桃、接骨木、乌荆子、桦、桃、梨、苹果、葡萄、樱桃等。

**分布** 黑龙江、河北、湖北、江西、广东、四川；日本，印度，伊朗，欧洲。

### 匀杂夜蛾 *Amphipyra tripartita* Butler (图版 XXVII-19)

*Amphipyra tripartita* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 288. (日本)

*Amphipyra tripartita*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 32. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 23.

翅展 55mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅 1 脉基部前方一小白点，基线仅前端现一白纹，内线、外线及亚端线白色，后者锯齿形并间断，中段内方赭褐色，外方一列黑纵纹；后翅暗褐带黑灰，端区色浓；腹部灰褐色。

**分布** 湖北、四川；日本，朝鲜。

### 暗杂夜蛾 *Amphipyra erebina* Butler (图版 XXVII-20)

*Amphipyra erebina* Butler, 1878, Ann. Mag. ent. Hist. 5 (1): 287. (日本)

*Amphipyra erebina*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 33. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 41—52mm。头、胸及翅褐色，前翅色稍浅，中区外半带有黑褐色，端区布有灰白细点，基线、内线均双线黑褐色波浪形，中线模糊黑褐色，外线黑棕色，外侧衬赭黄，波浪形，亚端线微白，内侧衬暗褐色，前段稍扩展，环纹小，有白环，肾纹不显；后翅褐色；腹部暗灰褐色。

**分布** 黑龙江、湖北、云南；日本，朝鲜。

### 蔷薇杂夜蛾 *Amphipyra perflua* (Fabricius) (图版 XXVII-21)

*Noctua perflua* Fabricius, 1787, Mant. Ins. 2: 179. (奥地利)

*Amphipyra perflua*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 34. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48mm。头、胸及前翅黑棕色，前翅外区浅褐色，端区色浅，内区有赭黄点，各横线浅褐色，内线波浪形，外线、亚端线锯齿形，环纹扁而斜，无肾纹，翅脉纹暗褐