

*Amphipyra pyramidea*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 28. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48—50mm。头、胸棕褐色；前翅暗赭微带紫色，基线、内线及外线均双线黑色，内线、外线锯齿形，环纹为一白环，外线齿尖为白点，亚端线灰黄，内侧衬黑棕色；后翅红赭色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣简单，无附件（图 449）。

**寄主** 栎、枫、榆、杨、柳、榛、胡桃、接骨木、乌荆子、桦、桃、梨、苹果、葡萄、樱桃等。

**分布** 黑龙江、河北、湖北、江西、广东、四川；日本，印度，伊朗，欧洲。

### 匀杂夜蛾 *Amphipyra tripartita* Butler (图版 XXVII-19)

*Amphipyra tripartita* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 288. (日本)

*Amphipyra tripartita*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 32. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 23.

翅展 55mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅 1 脉基部前方一小白点，基线仅前端现一白纹，内线、外线及亚端线白色，后者锯齿形并间断，中段内方赭褐色，外方一列黑纵纹；后翅暗褐带黑灰，端区色浓；腹部灰褐色。

**分布** 湖北、四川；日本，朝鲜。

### 暗杂夜蛾 *Amphipyra erebina* Butler (图版 XXVII-20)

*Amphipyra erebina* Butler, 1878, Ann. Mag. ent. Hist. 5 (1): 287. (日本)

*Amphipyra erebina*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 33. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 770. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 41—52mm。头、胸及翅褐色，前翅色稍浅，中区外半带有黑褐色，端区布有灰白细点，基线、内线均双线黑褐色波浪形，中线模糊黑褐色，外线黑棕色，外侧衬赭黄，波浪形，亚端线微白，内侧衬暗褐色，前段稍扩展，环纹小，有白环，肾纹不显；后翅褐色；腹部暗灰褐色。

**分布** 黑龙江、湖北、云南；日本，朝鲜。

### 蔷薇杂夜蛾 *Amphipyra perflua* (Fabricius) (图版 XXVII-21)

*Noctua perflua* Fabricius, 1787, Mant. Ins. 2: 179. (奥地利)

*Amphipyra perflua*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 34. —Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 108. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 251.

翅展 48mm。头、胸及前翅黑棕色，前翅外区浅褐色，端区色浅，内区有赭黄点，各横线浅褐色，内线波浪形，外线、亚端线锯齿形，环纹扁而斜，无肾纹，翅脉纹暗褐