

寄主 巴豆。

分布 山东、江苏、浙江、台湾、福建、广东、海南、云南、西藏；锡金，印度，缅甸，斯里兰卡，新加坡，印度尼西亚，非洲。

降卫翅夜蛾 *Amyna natalis* (Walker) (图版 XLI-18)

Berresa natalis Walker, 1859 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 214. (斯里兰卡)

Berresa meeki Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 199.

Berresa meeki: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 275.

Berresa natalis: Warren, 1913, ibid. 3: 276.

Amyna natalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 461.

Ilattiu natalis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

翅展 16 mm。头、胸及前翅褐色；前翅中室有一凹坑，基线仅前端现双黑纹，内线双线黑色，外线双线锯齿形，肾纹“8”字形，边缘为白点组成，亚端线隐约可见白色，端线为一系列黑点；后翅灰褐色。

分布 广东、海南；印度，缅甸，斯里兰卡，南太平洋若干岛屿，大洋洲。

雄蛾前翅反面除中室有凹坑外，中脉还明显弯曲，其后有一沟。

星卫翅夜蛾 *Amyna stellata* Butler (图版 XLI-20)

Amyna stellata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 162. (日本横滨)

Amyna stellata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 465. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 825.

Ilattia stellata: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 276. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

翅展 25 mm。头部褐色；胸、腹及前翅红褐色，雄蛾中室近中部有一坑，基线仅前端现一白纹，其余各横线暗褐色，内线与亚端线前端为白纹，剑纹、环纹不显、肾纹前半褐色，后半白色，外线锯齿形，齿尖为黑、白点，亚端线中段外弯，在 7 脉处成外突齿，翅外缘一系列衬白的黑点；后翅灰褐色，外线、端线暗褐色。

分布 广东、广西；日本。

肾卫翅夜蛾 *Amyna renalis* (Moore) (图版 XLI-21)

Ilattia renalis Moore, 1882, Lep. Atk. p. 113. (大吉岭)

Amyna renalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 466.

Ilattia renalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 274. —Chen, 1982, Icon.

Het. Sin. 3: 329. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang. p. 288. —Chen, 1992, in

Peng Icon. For. Ins. Hunan p.997.