

凡夜蛾 *Anachrostitis nigripunctalis* (Wileman) (图版 LXIV-14)

Rivulu [sic] *nigripunctalis* Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. Lond. p. 268. (日本)

Rivula nigripunctalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep, World 3: 441.

Acachrostitis nigripunctalis: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 890.

翅展 14 mm。头部与胸部褐黄色；前翅浅赭黄色，部分带褐色，各横线不明显，隐约可见内线和亚端线，后者较直内斜，肾纹只现一模糊暗褐点；后翅黄白色，微带褐色；腹部褐黄色。

分布 河南；日本。

薄夜蛾属 *Mecodina* Guenée

Mecodina Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 372.

Type-species: *Mecodina lanceola* Guenée.

Boethantha Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 982.

Seneratia Moore, [1885] 1887, Lep. Ceyl. 3: 220.

Araeognatha Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 31, 129.

喙发达，下唇须向上伸，镰刀状，但不弯向后，第二节达头顶，第三节长；胸部被平滑鳞片，无毛簇，中、后足胫节外缘饰毛；前翅稍窄，有一狭窄副室；后翅 5 脉发达，自中室下角发出。

种 检 索 表

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. 前翅亚顶斑明显 | 2 |
| 前翅亚顶斑不明显 | 云薄夜蛾 <i>Mecodina nubiferalis</i> |
| 2. 前翅亚顶斑后缘达翅外缘 | 白齿薄夜蛾 <i>M. albodentata</i> |
| 前翅亚顶斑后缘不达翅外缘 | 3 |
| 3. 体小，翅展 23—30 mm | 4 |
| 体大，翅展 30 mm 以上 | 5 |
| 4. 肾纹明显 | 缘斑薄夜蛾 <i>M. costimacula</i> |
| 肾纹不明显 | 紫灰薄夜蛾 <i>M. subviolacea</i> |
| 5. 肾纹有 2 白点 | 中带薄夜蛾 <i>M. lankestri</i> |
| 肾纹无白点 | 6 |
| 6. 肾纹后端一黑点 | 暗斑薄夜蛾 <i>M. praecipua</i> |
| 肾纹后端无黑点 | 7 |
| 7. 前翅中线明显 | 灰薄夜蛾 <i>M. cineracea</i> |
| 前翅中线不显 | 大斑薄夜蛾 <i>M. subcostalis</i> |