

窄眼夜蛾属 *Anarta* Ochsenheimer

Anarta Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 90.

Type-species: *Phalaena myrtilli* Linnaeus.

Charelia Sodoffsky, 1837, Bull. Soc. nat. Moscou, 10 (6): 88.

喙发达，下唇须短，向上伸，前缘饰毛，额突起成球面形，其下有一小角质片，复眼小，肾形，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，足胫节有毛；腹部被粗毛，基节背面有一毛簇，腹侧饰毛；前翅外缘曲度平稳，有一副室；后翅6、7脉共柄。

种 检 索 表

1. 前翅亚端线呈带状 暗带窄眼夜蛾 *Anarta fasciata*
前翅亚端线非带状 2
2. 前翅灰色 灰窄眼夜蛾 *A. grisea*
前翅非灰色 3
3. 前翅中室后有明显双齿形纹，环纹斜 丽窄眼夜蛾 *A. fumosa*
前翅中室后有单齿纹，环纹圆 环窄眼夜蛾 *A. orbiculosa*

暗带窄眼夜蛾 *Anarta fasciata* Chen (图版 XVII-11)

Anarta fasciata Chen, 1982, Ins. Xizang 2: 77, pl.2, fig.32. (西藏定日)

Anarta fasciata: Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.187.

翅展 21mm。头部灰黄色杂黑色，下唇须前缘饰长毛；胸部灰黄色杂黑色，下胸与足灰白色，前、中足胫节有黑纵条；前翅灰黄色，布有细黑点，内线隐约可见黑色，较粗，在中室后微外弯，肾纹大，黑色，内、外侧凹，其前方有一黑褐斑，中带绿褐色，外线弱，绿褐色，在前缘脉上为一黑点，亚端线为一绿褐色宽带，其外缘黑色，锯齿形，在7、8脉处明显外凸，在3、4脉及1脉处稍外凸，翅外缘前端绿褐色，缘毛黄褐色；后翅黄白色，基部及后缘区带有黑色，横脉纹大，黑色，端区有一黑色宽带；腹部灰黄色，各节背面有黑色横纹。

分布 西藏。

灰窄眼夜蛾 *Anarta grisea* (Chen) 新组合 (图版 XVII-12)

Discestra grisea Chen, 1995, 青海可可西里的生物与生理 p.160, fig.3, 19. (青海)

翅展 21mm。头、胸灰白杂少许黑色；前翅暗灰色，各横线模糊黑色，内线波浪形，外线、亚端线锯齿形，剑纹、环纹不显，肾纹模糊黑色，亚端线前段似一豆形斑；