

种 检 索 表

- 雄蛾后翅 6、7 脉共柄 树皮乱纹夜蛾 *Anisoneura aluco*
 雄蛾后翅 6、7 脉不共柄 乱纹夜蛾 *A. salebrosa*

树皮乱纹夜蛾 *Anisoneura aluco* (Fabricius) (图版LV-8)

Noctua aluco Fabricius, 1775, Syts. Ent. p. 591. (中国)

Anisoneura hypocyana Guenée, 1852, Hist. nat. Ins. Noct. 3: 162.

Anisoneura hypocyanea: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 260. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360.

Anisoneura aluco: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 31. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 853.

翅展 106 mm。头、颈板黑棕色，翅基片棕色；前翅褐棕色，前缘区带灰白色，基线棕黑色锯齿形，内线黑色，前端一黑三角形斑，环纹暗灰绿色，肾纹棕色，两侧及后方有黄点，中线棕色锯齿形，外线前半锯齿形内斜，后半弱，内侧衬白，亚端线双线黑色锯齿形内斜；后翅褐棕色，中线双线，外线微黑衬白，锯齿形，亚端线黑色，外侧灰色；腹部暗棕色。

分布 福建、海南、四川、云南、西藏；印度，缅甸，马来西亚，新加坡。

乱纹夜蛾 *Anisoneura salebrosa* Guenée (图版LV-11)

Anisoneura salebtosa Guenée, 1852, in Boisduval & Guenée, Hist. Nat. Ins. 3: 161. (Bengal)

Anisoneura obscurata Pagenstecher, 1896, J. B. Nass. Verh. 49: 160. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 263. text fig. 63.

翅展 62 mm。头部、胸部与前翅褐色杂少许灰色，前足胫节中部有白点；前翅各横线不清晰，黑褐色，基线仅在前缘区较显，内线双线，不规则波曲并有间断，在中室后缘成一纵纹，中线双线，外线前段被一大黑褐斑融合，后半双线，波浪形，内线、中线与外线后半近平行，均强内斜，亚端线波浪形，内斜；后翅褐色，各横线近平行，均内斜，微波浪形；腹部黑褐色。

分布 福建；锡金，印度，孟加拉国，印度尼西亚。

安尼夜蛾属 *Anydrophila* John

Anydrophila John, 1909, Rev. russ. ent. 9: 123.

Type-species: *Euclidia mirifica* Erschov.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触