

喙发达，下唇须向上伸，似镰刀形，第二节前缘饰毛，第三节稍长，雄蛾触角锯齿形；胸部与腹部被鳞片，前足腿节与胫节饰长毛，前翅前、后缘亚平行，外缘前半稍凹，后翅前缘基部拱曲，5脉发达。

### 泛夜蛾 *Cephenia costata* Moore (图版 LX-25)

*Cephenia costata* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 196, pl. 6, fig. 17. (印度)

*Cephenia costata*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 28, fig. 11.

翅展 40 mm。头部赭白色，下唇须前缘饰密毛；胸部褐黄色；前翅赭黄色，前缘区有一列不整齐黑棕纹，自内区至中外区，一黑棕色纵纹自中室中部外伸至翅外缘，其上有一列细白纵纹位于中室后缘，亚端区可见一列褐色细纹，在后缘区为明显黑点，翅后缘近端部稍凹；后翅黑褐色；腹部赭褐色，端半部色暗。

**分布** 海南；锡金，印度。

## 谷夜蛾属 *Anoba* Walker

*Anoba* Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1814.

Type-species: *Anoba* [sic] *trigonoides* Walker.

*Galapha* Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1850.

*Tephrias* Wallengren, 1860, Wien. ent. Monatschr. 4: 170.

*Baragha* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 1002.

*Bessacta* Warren, 1912, Nov. zool. 19: 52.

喙发达，下唇须向上伸，第二节长，达头顶，雄蛾触角线形，有长鬃，雄蛾中足腿节与胫节之间有长毛簇，中、后足胫节均饰毛；前翅顶角稍尖，后翅5脉发达，自中室下角稍前发出。

### 种 检 索 表

- 前翅有众多分裂小斑 ..... 裂斑谷夜蛾 *Anoba polypila*  
 前翅斑块完整 ..... 波谷夜蛾 *A. sinuata*

### 裂斑谷夜蛾 *Anoba polypila* (Walker) (图版 LX-28)

*Athyrra polypila* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 966. (印度；孟加拉国)

*Baniana polypila*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 514.

*Baniana polypila*: Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 514. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 368.

翅展 45 mm。头部黑棕色杂有白色，头顶有一黄白色横纹，下唇须上缘、第二节

端部及第三节灰色；胸部黑棕色杂有白色；前翅灰褐色，后缘区近基部有一约呈斜方形的黄边黑斑，环纹只现一黑点，肾纹略呈三角形，黑色黄边，前方在前缘脉上有一黑点，后方有一大黑斑，由黄线分割，其内缘波浪形，其后另一小黑斑，外线双线灰黄色，自前缘脉后外弯至3脉，内侧有一列小黑斑，多呈圆形，外侧有一列稍大黑斑，不规则形，均有黄边，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，外半部色暗；腹部暗灰色。雌蛾体大，前翅基部及中室黑色，内线与中线黄白色，曲折，将黑色部分分割成不规则形块，外区斑纹似雄蛾，但较粗大。

**分布** 四川、云南；缅甸，印度，孟加拉国，巴基斯坦。

### 波谷夜蛾 *Anoba sinuata* (Fabricius) (图版 LX-27)

*Noctua sinuata* Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 611. (印度)

*Athyra intorta* Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 150, pl. 8, fig. 13.

*Baniana intorta*; Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9; pl. 163, fig. 3. ——Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 515.

翅展 28 mm。头部与颈板黑褐色；胸部与前翅灰色，前翅基部有一黑褐色斑，位于中室基部后方，其内缘直，外缘中部外突，后端稍外斜，达翅后缘，外线黑色，自前缘脉内斜至5脉折向内达中室下角，与此处一黑斑相合，再折向后行并稍波曲，外线外方带有黑色，向外渐成褐色，亚端线隐约可见，黑褐色，不规则波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，基部色较浅；腹部灰色。

**分布** 海南；印度，非洲。

## 盾夜蛾属 *Athyra* Hübner

*Athyra* Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 267.

Type-species: *Phalaena adjutrix* Cramer.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，斜向前伸，额光滑无突起，上部有一尖形鳞簇，触角线形，复眼大，圆形；胸部无毛簇，雄蛾前足胫节饰长毛，中足胫节或具刺；前翅顶角稍尖。

### 种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 ..... 黑斑盾夜蛾 *Athyra chinensis*  
 雄蛾触线形 ..... 泉盾夜蛾 *A. bubo*

### 泉盾夜蛾 *Athyra bubo* Geyer (图版 LX-23)

*Athyra bubo* Geyer, 1832, Zutr. 4: 13, pl. 110, figs. 633—634. (爪哇)