

端部及第三节灰色；胸部黑棕色杂有白色；前翅灰褐色，后缘区近基部有一约呈斜方形的黄边黑斑，环纹只现一黑点，肾纹略呈三角形，黑色黄边，前方在前缘脉上有一黑点，后方有一大黑斑，由黄线分割，其内缘波浪形，其后另一小黑斑，外线双线灰黄色，自前缘脉后外弯至3脉，内侧有一列小黑斑，多呈圆形，外侧有一列稍大黑斑，不规则形，均有黄边，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，外半部色暗；腹部暗灰色。雌蛾体大，前翅基部及中室黑色，内线与中线黄白色，曲折，将黑色部分分割成不规则形块，外区斑纹似雄蛾，但较粗大。

分布 四川、云南；缅甸，印度，孟加拉国，巴基斯坦。

波谷夜蛾 *Anoba sinuata* (Fabricius) (图版 LX-27)

Noctua sinuata Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 611. (印度)

Athyra intorta Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 150, pl. 8, fig. 13.

Baniana intorta: Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: pl. 163, fig. 3. —Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 515.

翅展 28 mm。头部与颈板黑褐色；胸部与前翅灰色，前翅基部有一黑褐色斑，位于中室基部后方，其内缘直，外缘中部外突，后端稍外斜，达翅后缘，外线黑色，自前缘脉内斜至5脉折向内达中室下角，与此处一黑斑相合，再折向后行并稍波曲，外线外方带有黑色，向外渐成褐色，亚端线隐约可见，黑褐色，不规则波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，基部色较浅；腹部灰色。

分布 海南；印度，非洲。

盾夜蛾属 *Athyra* Hübner

Athyra Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 267.

Type-species: *Phalaena adjutrix* Cramer.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，斜向前伸，额光滑无突起，上部有一尖形鳞簇，触角线形，复眼大，圆形；胸部无毛簇，雄蛾前足胫节饰长毛，中足胫节或具刺；前翅顶角稍尖。

种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 黑斑盾夜蛾 *Athyra chinensis*
雄蛾触线形 泉盾夜蛾 *A. bubo*

泉盾夜蛾 *Athyra bubo* Geyer (图版 LX-23)

Athyra bubo Geyer, 1832, Zutr. 4: 13, pl. 110, figs. 633—634. (爪哇)