

黑褐色，端部浅灰色；后翅暗灰褐色，缘毛浅灰色，中段杂有灰褐色；腹部暗灰褐色。

**分布** 福建；日本，印度。

**小桥夜蛾 *Anomis flava* (Fabricius) (图版LV-23)**

*Noctua flava* Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 601. (India Orientali)

*Cosmophila xanthyindyma* Boisduval, 1833, Fn. ent. Madag. p. 94.

*Anomis flava*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 857. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 361.

翅展 25 mm。头、胸及前翅黄色，前翅外半褐黄色，基、内线红棕色，后者较直外斜，线内方密布红棕细点，环纹白色，边线褐色，中线红棕色，二曲形，肾纹暗棕褐色，中有二黑点，外线深褐色，锯齿形，自前缘脉后外弯，在中褶处内凸，4脉后稍内斜，中线与外线之间色暗，亚端线暗褐色，不规则锯齿形，在7脉处外凸，2—5脉间外弯，端线暗褐色，翅外缘中部微外突；后翅淡褐色，端区色较暗；腹部灰黄色。

**寄主** 棉、木槿、蜀葵、苘麻、冬苋、菜、烟草、木耳菜等；成虫吸食柑橘、芒果、番石榴、黄皮等果汁。

**分布** 内蒙古、山东、河南、福建，除西北若干省区外，其他棉区都有；欧洲，亚洲，非洲。

**中桥夜蛾 *Anomis mesogona* (Walker) (图版LV-24)**

*Gonitis mesogona* Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1012. (斯里兰卡)

*Gonitis mesogona*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 86. ——Leech, 1889, Trans. ent. Soc. p. 134.

*Cosmophila mesogona*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 408. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 360.

*Anomis mesogona*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 159. ——Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 37. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 858. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 362.

翅展 38 mm。头、胸及前翅暗红褐色，前翅基线褐色，不清晰，自前缘脉至1脉，内线褐色，内侧衬灰色，自前缘脉外斜至中室后缘，折角内弯，1脉后外斜，环纹不显，肾纹暗灰色，前、后端各有一黑圆点，外线褐色，自前缘脉后波曲外弯，在3脉处内伸达肾纹后端，折角后垂，亚端线褐色；后翅褐色；腹部暗灰褐色。

**寄主** 红悬钩、醋栗。

**分布** 黑龙江、河北、山东、浙江、湖北、湖南、福建、海南、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，马来西亚。