

垂，亚端线白色近直线内斜，内方深褐色，外侧一列三角形黑纹，端区3、4脉间及2脉端有密集黑褐纹；后翅浅黄色，外半及中室后带有褐色，中部一黑曲线；腹部褐色。

分布 海南；加里曼丹。

桥夜蛾属 *Anomis* Hübner

Anomis Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 249.

Type-species: *Anomis erosa* Hübner.

Cosmophila Boisduval, 1833, Nouv. Ann. Mus. Hist. nat. 2: 242.

Gonitis Guenee, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 403.

Rusicada Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 984.

Molopa Swinhoe, 1902, Ann. Mag. nat. Hist. 7 (9): 420.

Gonopteronia Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 239.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节细长，额有一钝角毛簇，雄蛾触角具微细纤毛或栉形；胸部和腹部鳞片平滑，胫节无刺；腹部只基节上有一毛簇；前翅顶角略外突；外缘中部成一角形凸出；后翅5脉从中室外缘中部略后方伸出。

种 检 索 表

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. 雄蛾前翅前缘基部突起 | 2 |
| 雄蛾前翅前缘基部无突起 | 3 |
| 2. 体大 (45—52mm) | 8 |
| 体小 (45mm 以下) | 连桥夜蛾 <i>Anomis combinens</i> |
| 3. 前翅外缘曲度平稳 | 若桥夜蛾 <i>A. figlina</i> |
| 前翅外缘中部折角 | 4 |
| 4. 前翅内半黄色，外半黄褐色 | 小桥夜蛾 <i>A. flava</i> |
| 前翅内、外半同色 | 5 |
| 5. 前翅顶角尖外突 | 中桥夜蛾 <i>A. mesogona</i> |
| 前翅顶角不尖外突 | 6 |
| 6. 前翅端区色浅 | 黄衣桥夜蛾 <i>A. involuta</i> |
| 前翅端区一色 | 7 |
| 7. 雄蛾阳茎端有锯齿 | 坎桥夜蛾 <i>A. commoda</i> |
| 雄蛾阳茎端无锯齿 | 暗桥夜蛾 <i>A. metaxantha</i> |
| 8. 前翅外缘中突成尖齿 | 巨桥夜蛾 <i>A. maxima</i> |
| 前翅外缘中突不成尖齿 | 超桥夜蛾 <i>A. fulvida</i> |

超桥夜蛾 *Anomis fulvida* Guenée (图版LV-20)

Anomis fulvida Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 397. (美洲北

部)

Cosmophila fulvida: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 409.

Rusicada fulvida: Warren, 1913, in Seitz. Macrolep. World 3: 360.

Anomis fulvida: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 362.

翅展 40—49 mm。头、胸棕色杂黄色；前翅橙黄色，密布赤锈色细点，基线紫红棕色，自前缘脉达 1 脉，其后杂有灰褐色，内线紫红棕色，波浪形外斜，环纹只现一白点，中红紫红棕色，微波浪形，贴近肾纹，肾纹不很清晰，后半为一黑棕色圈，外线紫红棕色，波浪形，在中褶及 3、4 脉间较深内凸，亚端线深紫棕色，不规则波浪形，内侧紫棕色较晕散，7 脉处成一粗点状，翅外缘中部外突成钝齿状，缘毛橙黄色，端部白色；后翅褐色，端区色较暗；腹部灰褐色。

寄主 棉；成虫吸食芒果、黄皮、柑橘等果汁。

分布 山东、浙江、福建、江西、广东、四川、云南；印度，斯里兰卡，缅甸，印度尼西亚，大洋洲，美洲。

连桥夜蛾 *Anomis combinans* (Walker) (图版LV-21)

Gonitis combinans Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1001. (斯里兰卡)

Gonitis revocans Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1794.

Anomis busana Swinhoe, 1920, Ann. Mag. nat. Hist. 9 (5): 253.

Anomis revocans: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 859.

翅展 45—50 mm。头部与胸部赭色杂黄色，下胸赭黄色，足内侧及各节间有白斑；前翅底色橙黄，密布赭红色细点，基线赭红色，自前缘脉外弯达中室，内线赭红色，波曲外斜，至亚中褶处折向后，环纹小，浅黄色点状，外围赭红色，肾纹不明显，仅横脉上一赭红纹，外线赭红色，不规则锯齿形，自前缘脉外弯至 3 脉折向内伸至中室下角后波曲后行，亚端线隐约可见，不规则锯齿形，内侧暗褐色，翅外缘中部成一钝角，其后呈直线内斜；后翅浅褐色；腹部浅褐灰色，端部几节背面带红褐色。

分布 广东；斯里兰卡，澳大利亚，加里曼丹。

若桥夜蛾 *Anomis figlina* Butler (图版LV-22)

Anomis figlina Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 71, pl. 131, fig. 2. (印度)

Anomis figlina: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 858, pl. 211, figs. 3, 4.

翅展 32 mm。头部与胸部灰褐色带赤褐色，下唇须及前足胫节与跗节外侧暗灰褐色；前翅灰褐色，部分带橙色，前缘区暗褐色达外线，内线黑褐色，不规则波浪形外斜，环纹不显，肾纹暗褐色，模糊，外线黑色，不规则波浪形，自前缘脉外斜至 6 脉折向内斜，3 脉后内伸达肾纹后端，折角波曲后垂，3 脉之前色浓且清晰，亚端线不明显，内侧衬暗褐色，在中褶与亚中褶处内弯，其余不规则波浪形，翅外缘黑褐色，缘毛基部