

端线极模糊，暗褐色，不规则锯齿形，在中褶与亚中褶处内弯，翅外缘中部外突成一齿，其前方的翅外缘微凹，后方的翅外缘斜削，微锯齿形，缘毛红棕色，端部白色；后翅暗褐色，缘毛杂有褐白色；腹部暗灰褐色，腹面带红褐色。

分布 江苏、浙江、广东。

暗桥夜蛾 *Anomis metaxantha* (Walker) (图版LV-28)

Gonitis metaxantha Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 13: 1005. (未注明模式产地)

Anomis metaxantha: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 859. ——Lu, 1994, Butterflies & Moths Mt. Tai p. 95.

翅展 44 mm。头部与胸部浅黄褐色带紫色，前足胫节有白斑；前翅浅黄褐色，内线褐色，波浪形外斜，环纹与肾纹不清晰，后者后半为一褐圆斑，外线褐色，不规则波曲，至中室下角后较直内斜，亚端线不清晰，前半段与外线近平行，翅外缘黑棕色，缘毛端部间白色；后翅褐色；腹部暗褐色。

分布 广西；印度，日本。

利翅夜蛾属 *Oxygonitis* Hampson

Oxygonitis Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 103.

Type-species: *Oxygonitis sericeata* Hampson.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴前额伸达头顶，第三节短小，触角线形，雄蛾有纤毛丛，胸部被平滑鳞片，前翅顶角外突成一齿，翅外缘中部强外突，其后微锯齿形，顶角至 4 脉间凹，后翅外缘微锯齿形，臀角稍尖，翅后缘外端斜削，雌蛾 3、4 脉共柄。

利翅夜蛾 *Oxygonitis sericeata* Hampson (图版LV-29)

Oxygonitis sericeata Hampson, 1893, Het. Colln Br. Mus. 9: 22, pl. 163, fig. 1. (斯里兰卡; Wattegama)

Oxygonitis sericeata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 415. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 362.

翅展 34 mm。头部灰褐色带紫色，触角基节有一灰白色斑，下唇须浅灰褐色，第三节极短小；胸部背面灰褐色带紫色，前足与中足胫节外侧褐灰色；前翅暗褐色，内半部带有紫灰色，密布暗褐细点，内线极细弱，灰色，自前缘脉微曲外斜，中室后较直，环纹外围由白色细点组成一近圆形圈，中央褐灰色，肾纹大，可见由灰白色细点组成的边缘，后端远超出中室下角，内、外缘中凹，外线淡褐色，自前缘脉外斜至 9 脉，折角