

聚尤夜蛾 *Eutamsia confundens* (Walker) (图版 XXIX-18)

Hadena confundens Walker, 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 757. (斯里兰卡)

Hadena confundens: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3:

Condica confundens: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 218.

翅展 37mm。头、胸红褐色；前翅暗褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹近长方形，暗褐色，环、肾纹黄褐色，后者外侧有白点，中线黑色波浪形，亚端线赭黄色锯齿形，中段内侧一列黑齿纹；后翅黄白，外半带褐色；腹部褐色。

分布 江西、海南、西藏；印度，斯里兰卡。

斑尤夜蛾 *Eutamsia siderifera* (Moore) (图版 XXIX-19)

Hadena siderifera Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 357. (印度)

Trachea siderifera: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 202. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 256

Condica siderifera: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 218.

Eutamsia siderifera: Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p.532.

翅展 46mm。头、胸褐色带紫色；前翅褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线锯齿形，外线波浪形杂锯齿形，剑纹大，近方形，环纹及肾纹褐色，环纹前端有二白点，肾纹外半有一白圆斑，斑前后各一白点，内缘中央一黑点，前后各一白点，前端二白点间有一白弧形，中线黑棕色，亚端线浅褐黄色，两侧有黑纹；后翅与腹部褐色。

分布 江西、福建、云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，非洲。

道夜蛾属 *Antapamea* Sugi

Antapamea Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 743.

Type-species: *Apamea conciliata* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，头、胸主要被鳞片，头顶有鳞脊、前、后胸有分裂型毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面有一列毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉微弱，自中室横脉中下部发出。

道夜蛾 *Antapamea conciliata* (Butler) (图版 XXIX-20)

Apamea conciliata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 84. (日本)

Trachea conciliata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 177.

Antapamea conciliata: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 742.

翅展 42mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，头、胸带黄褐色，前翅带霉绿色，亚中褶基部有红褐色，肾纹外侧带黄褐色，1脉基部前有一黑纵纹，基线、内线均双线黑色，前者只前段可见，内线波浪形，中线黑色波浪形，外线黑色锯齿形，亚端线灰白色，内侧一列暗褐齿纹，剑纹后一黑纹伸至外线，环纹及肾纹前缘一黑纹相连；后翅褐灰，端区色暗，外线可见。

分布 黑龙江、河北；日本。

径夜蛾属 *Pareuplexia* Warren

Pareuplexia Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 187.

Type-species: *Naenia chalybeata* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，额光滑，复眼大，触角线形；胸部被毛和鳞片，前、后胸有毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅稍窄，有一副室；后翅 5 脉细弱。

种 检 索 表

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. 前翅前缘区锈红色 | 红缘径夜蛾 <i>Pareuplexia ruficosta</i> |
| 前翅一色 | 2 |
| 2. 肾纹不显 | 铅色径夜蛾 <i>P. chalybeata</i> |
| 肾纹可见 | 3 |
| 3. 前翅褐色带紫灰 | 焰径夜蛾 <i>P. flammifera</i> |
| 前翅黑褐色，有蓝鳞 | 黄纹径夜蛾 <i>P. luteistigma</i> |

红缘径夜蛾 *Pareuplexia ruficosta* Warren (图版 XXIX - 21)

Pareuplexia ruficosta Warren, 1911, Nov. zool. 18: 142. (锡金)

Pareuplexia ruficosta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 152.

翅展 57mm。头、胸及前翅深棕色，后者有蓝灰色鳞，基线双线黑色波浪形，内线、外线棕红色，内线外方的前缘区似锈红色条，剑纹窄长，肾纹黑褐色，前端向前外方伸，后端内突与环纹相连，外线后半波浪形，外方各翅脉杂灰色，内侧一列黑褐小斑，亚端线褐黄色，内侧一列黑斑，但 6 脉前的斑红棕色，后翅褐色；腹部灰褐色。

分布 西藏；锡金。

铅色径夜蛾 *Pareuplexia chalybeata* (Moore) (图版 XXIX - 22)

Naenia chalybeata Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 64. (Bengal)

Paratrachea chalybeata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 217. ——Chen, 1982,