

色；腹部浅褐色。雄蛾抱器瓣宽，端部窄；抱钩长棘形，阳茎有一长棘形角状器（图519）。

寄主 甜菜、棉、马铃薯、豆类、番茄、多种蔬菜等。

分布 华北、华东、华中、华南、西南；日本，印度，缅甸，亚洲西部，大洋洲，欧洲，非洲。

斜额夜蛾属 *Antha* Staudinger

Antha Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 448.

Type-species: *Antha pretiosa* Staudinger.

Anodontodes Hampson, 1895, Trans. ent. Soc. Lond. p. 302.

喙发达，下唇须向上伸，第二节不达头顶，第三节长，额斜，上方有一横脊，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛，两触角间有一鳞脊；胸部主被鳞片，前胸有分散的毛簇，后胸有小毛簇，胫节饰毛中常；腹部长，基部几节背面有毛簇；前翅前缘较直，顶角略呈长方形，外缘在4脉后内斜，后缘近基部稍突出，有副室。

斜额夜蛾 *Antha grata* (Butler) (图版XXXIV-31)

Leptina grata Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 172. (日本东京)

Antha grata: Hampson, 1909, Ca. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 275. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 772. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 248.

翅展37 mm。头部褐色；胸部与前翅黄褐色，前翅中室后半至1脉带霉绿色，基线微白，前端黑色，内线，中线及外线黑色，内线波浪形，环、肾纹褐色白边，中线后端双线内伸，外线外侧衬白色，后半锯齿形，亚端线微白，外侧黑棕色，端线双线，一白色，一黑棕色，外线外方的翅脉黑棕色，在1—3脉上有白纹；后翅褐色；腹部黑灰色，基部几节黄褐色。

分布 黑龙江、福建、贵州、云南；日本，朝鲜，印度。

陞夜蛾属 *Chilodes* Herrich-Schäffer

Chilodes Herrich-Schäffer, (1849), Syst. Bearb. Schmett. Eur. p. 226.

Type-species: *Noctua ulvae* Hubner.

Hypostilbia Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 293.

喙发达，下唇须向上伸，额光滑，复眼大，触角线形；前胸有毛簇；前翅窄长。有一长副室；后翅5脉细弱，3、4脉和6、7脉共柄。