

干煞夜蛾属 *Anticarsia* Hübner

Anticarsia Hübner, 1818, Zutr. Saaml. exot. Schmett. 1: 26.

Type-species: *Anticarsia gemmatalis* Hübner.

Azazia Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1546.

喙发达，额上方有一向前伸的尖形毛簇，下唇须斜向前伸，第二节厚，第三节短，向前伸；胸部及腹部鳞片平滑，胫节无刺，雄蛾触角节间两侧有短毛成羽状；前翅前缘较直，但在顶角处向下凹，于是形成顶角较尖，后缘较长，外缘较直，但在外缘中部略外拱，而在臀角处向内曲。

干煞夜蛾 *Anticarsia irrorata* (Fabricius) (图版 LXII-11)

Noctua irrorata Fabricius, 1781, Spec. Ins. 2: 506. (India Orientali)

Ophiusa rubricans Boisduval, 1833, Fn. Madag. p. 106.

Azazia rubricans: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 381. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370.

Anticarsia irrorata: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 486. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 869.

翅展 39 mm。头、胸灰褐色；前翅与腹部红褐色，前翅内、中线褐黑色，环纹为一黑点，肾纹大，前后部各一黑点，外线暗褐色，在 6 脉折角内斜，外侧一平行同色线，中段外侧有一小黑褐斑，亚端线




图 659 干煞夜蛾 *Anticarsia irrorata* (Fabricius)
♂ 外生殖器

为一列黑点，顶角一内斜黑纹；后翅红褐色，前缘区黄白色，中、外线暗褐色，亚端线为一列黑点。雄蛾抱器瓣宽，无附件（图 659）。

寄主 葛藤。

分布 浙江、湖南、福建、广东、海南、云南；日本，印度，南太平洋若干岛屿，非洲。

沟翅夜蛾属 *Hyospila* Guenée

Hyospila Guenée, 1852, in Boisduval *et* Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 358.