

Type-species: *Anumeta atrosignata* Walker.

*Palpangula* Staudinger, 1877, Stett. ent. Zeit. 38: 196.

*Imitator* Alpheraky, 1883, Hor. Soc. ent. ross. 17: 170.

*Eremonoma* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 394.

喙发达，下唇须斜向上伸，约达头顶，第三节细长，向前平伸，雄蛾触角线形，有短纤毛丛；胸部被平滑鳞片，中足与后足胫节上缘饰长毛，但不连贯，毛粗似刺，跗节细长。

### 种 检 索 表

1. 后翅白色 ..... 2  
     后翅褐色 ..... 碎纹漠夜蛾 *Anumeta fractistrigata*  
 2. 前翅外线在 4、5 脉处强外突 ..... 锯纹漠夜蛾 *A. dentistrigata*  
     前翅外线在 4、5 脉处外弯 ..... 绣漠夜蛾 *A. cestis*

#### 碎纹漠夜蛾 *Anumeta fractistrigata* (Alpheraky) (图版 LXIII-24)

*Palpangula fractistrigata* Alpheraky, 1882, Hor. Soc. ent. ross. 17: 96, pl. 8, fig. 64.  
 (Khorgoose)

*Anumeta fractistrigata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 389. pl. 70g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.

翅展 25 mm。头部黑棕色，杂有灰白色，触角背缘黑色，腹缘灰白色，额外围灰白色，下唇须第一节外侧白色，第二节外侧基部白色约呈三角形，其余黑色；胸部背面黑棕色杂有灰白色，下胸与足灰白色，足外侧有黑点，前足胫节有刺，端部一刺较粗长；前翅淡黄灰色杂有黑色，内线黑色，锯齿形，线内方的前缘脉上有一列黑白相间的粗点，内线内侧衬白色，肾纹黄白色，黑边，中线黑色，在肾纹外侧微外弯，外线黑色，细锯齿形，在前缘脉上为一粗黑点，其后外弯，6 脉后较直向后，线外侧衬黄白色，亚端线黄白色，二曲线，在 4 脉处成外凸齿，线内侧黑褐色，外线与亚端线间的前缘脉上有黑白相间的点列，亚端线外方及亚中褶大部褐色，端线由一系列黑点组成；后翅褐色，外线细，黑色，二曲形，端区中部有一黑色圆形斑，亚中褶及 6 脉端部各有一黄白斑，缘毛白色；腹部淡褐灰色。

分布 新疆；中亚地区。

#### 锯纹漠夜蛾 *Anumeta dentistrigata* (Staudinger) (图版 LXIII-25)

*Leucanitis dentistrigata* Staudinger, 1877, Ent. Ver. Stett. 38. (Krawnnowodsk)

*Anumeta dentistrigata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 388. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展 36 mm。头部白色杂暗褐色，触角基节上缘有黑褐点，额下部两侧有黑点，下唇须第一节及第二节外侧基半部白色，后者约呈三角形，其余黑色；胸部背面白色杂暗褐色，前足胫节具不规则排列的刺，端部二刺较粗大；前翅棕褐色，杂有褐黄色，基线黑色，大波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，深波浪形，环纹不显，肾纹模糊，微黑，可见黑边，外线黑色，微波浪形，自前缘脉后外弯，在 4—5 脉间明显外凸，4 脉后强内伸，在亚中褶成一内凸齿，其后外弯，1 脉后外斜，线中段内侧色暗，亚端线白色，在 7 脉及 5 脉处内凸，6—7 脉间成一外凸细齿，近达翅外缘，4 脉后内斜，至亚中褶折角外弯，线内侧在 4 脉前均带黑色，外线与亚端线间的前缘脉上有一列白点，翅脉纹黑色，缘毛白色，端半部间有褐色；后翅黄白色，外线微黑，翅脉纹褐色，亚端区有一大黑斑位于 2—5 脉间，约呈方形，内缘模糊，前后黑褐色模糊带状，端线黑褐色；腹部黄白色。

**分布** 新疆、西藏；俄罗斯。

### 绣漠夜蛾 *Anumeta cestis* (Ménétriès) (图版 LXIII-26)

*Catephia cestis* Ménétriès, 1848, Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 6: 74, pl. 6, fig. 10.  
(Bachkirie)

*Ophiusa punctata* Ménétriès, 1848, Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 6: 76.

*Anumeta cestis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 388, pl. 70e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展 32 mm。头部褐色，下唇须基部白色，第二节端部及第三节黑色；胸部背面褐色；前翅棕褐色杂有褐黄色，内线内方及前缘区色较灰，内线隐约可见，黑褐色深锯齿形，环纹只现一黑棕色点，肾纹黑棕色，边缘不清晰，外线黑棕色，自前缘脉外弯，4 脉后内弯，亚中褶处外凸，后半段内侧色暗，外侧衬以黄白色，亚端线黄白色，自前缘脉强外弯，在 7 脉处近达翅外缘，在中褶处强内凸，4 脉后内弯，线内侧色较暗，外线与亚端线间的前缘脉上有黑白相间的点列，翅外缘有一列尖端内向的齿形黑点；后翅白色，亚端区有一大黑斑，位于亚中褶与 5 脉间，近扁圆形，其前端连一模糊小黑斑，后端连一近扁圆形小黑斑达臀角，亚中褶有一赭黄色纵纹；腹部白色。

**分布** 新疆、甘肃；阿尔及利亚。

## 妃夜蛾属 *Drasteria* Hübner

*Drasteria* Hübner, 1818, Zutr. Saaml. exot. Schmett. p. 8.

Type-species: *Drasteria graphica* Hübner.

*Bolina* Duponchel, [1845], Cat. Meth. Lep. Eur. p. 180.

*Leucanitis* Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 7: 58.