

Type-species: *Anumeta atrosignata* Walker.

*Palpangula* Staudinger, 1877, Stett. ent. Zeit. 38: 196.

*Imitator* Alpheraky, 1883, Hor. Soc. ent. ross. 17: 170.

*Eremonoma* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 394.

喙发达，下唇须斜向上伸，约达头顶，第三节细长，向前平伸，雄蛾触角线形，有短纤毛丛；胸部被平滑鳞片，中足与后足胫节上缘饰长毛，但不连贯，毛粗似刺，跗节细长。

### 种 检 索 表

1. 后翅白色 ..... 2  
   后翅褐色 ..... 碎纹漠夜蛾 *Anumeta fractistrigata*  
 2. 前翅外线在 4、5 脉处强外突 ..... 锯纹漠夜蛾 *A. dentistrigata*  
   前翅外线在 4、5 脉处外弯 ..... 绣漠夜蛾 *A. cestis*

#### 碎纹漠夜蛾 *Anumeta fractistrigata* (Alpheraky) (图版 LXIII-24)

*Palpangula fractistrigata* Alpheraky, 1882, Hor. Soc. ent. ross. 17: 96, pl. 8, fig. 64.  
 (Khorgoose)

*Anumeta fractistrigata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 389. pl. 70g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.

翅展 25 mm。头部黑棕色，杂有灰白色，触角背缘黑色，腹缘灰白色，额外围灰白色，下唇须第一节外侧白色，第二节外侧基部白色约呈三角形，其余黑色；胸部背面黑棕色杂有灰白色，下胸与足灰白色，足外侧有黑点，前足胫节有刺，端部一刺较粗长；前翅淡黄灰色杂有黑色，内线黑色，锯齿形，线内方的前缘脉上有一列黑白相间的粗点，内线内侧衬白色，肾纹黄白色，黑边，中线黑色，在肾纹外侧微外弯，外线黑色，细锯齿形，在前缘脉上为一粗黑点，其后外弯，6 脉后较直向后，线外侧衬黄白色，亚端线黄白色，二曲线，在 4 脉处成外凸齿，线内侧黑褐色，外线与亚端线间的前缘脉上有黑白相间的点列，亚端线外方及亚中褶大部褐色，端线由一系列黑点组成；后翅褐色，外线细，黑色，二曲形，端区中部有一黑色圆形斑，亚中褶及 6 脉端部各有一黄白斑，缘毛白色；腹部淡褐灰色。

分布 新疆；中亚地区。

#### 锯纹漠夜蛾 *Anumeta dentistrigata* (Staudinger) (图版 LXIII-25)

*Leucanitis dentistrigata* Staudinger, 1877, Ent. Ver. Stett. 38. (Krawnnowodsk)

*Anumeta dentistrigata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 388. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.