

角线形，有长纤毛丛，后胸有散开型毛簇，中、后足胫节近中部及端部上缘有毛簇，中、后足胫节具刺；前翅有一副室；后翅中室长约为翅之半，5脉发达，自中室下角发出；腹部无毛簇。

### 比安尼夜蛾 *Anydrophila imitatrix* (Christoph) (图版LV-12)

*Palpangula imitatrix* Christoph, 1887, Stett. ent. Zeit. p. 165. (土库曼)

*Anydrophila imitatrix*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 267. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 340, pl. 62c. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360.

翅展 34 mm。头部褐色杂灰白色及少许黑色，下唇须微黑，第二节端部与第三节白色；胸部背面褐色杂灰白色及少许黑色，下胸与足白色，前、后足跗节有黑色及白色条纹；前翅浅灰色，密布褐色细点，前缘区基部有一黑纹，内线隐约可见黑褐色，在前缘脉上为一小斑，在中室前较外凸，其后内斜，波浪形，前缘脉中部有一暗褐斑，中室端部外有一隐约暗褐斑，外线黑褐色，在前缘脉后外突，其后外弯，在中褶处成一强外突角，波浪形内斜至 2 脉，回升至中室后再折向后，顶角至外线有一暗褐斜纹，端线黑褐色，波浪形，各翅脉间有一黑点，缘毛基部浅褐色，端部黑褐色与白色相间；后翅金黄色，顶角有一大黑斑，其后端达 4 脉，其后有 2 黑斑位于端区中部及臀角，缘毛白色，中有一浅褐线，但前端不显；腹部背面淡褐黄色，腹面及端部灰白色。

分布 新疆；阿富汗，中亚地区。

## 望夜蛾属 *Clytie* Hübner

*Clytie* Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett, p. 267.

Type-species: *Noctua illunaris* Hübner.

*Pseudophia* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 234.

*Hypoglaucitis* Staudinger, (1895) 1894, Iris, 7: 284.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节斜；额平滑无突起，有毛簇；复眼圆大；雄蛾触角线形；胸部无毛簇，有毛；前足胫节无刺，后足胫节具刺；腹部背面无毛簇；前翅有副室。

### 种 检 索 表

1. 前翅黄灰色 ..... 黄黑望夜蛾 *Clytie luteonigra*
- 前翅褐或灰褐色 ..... 2
2. 前翅亚端线在 7 脉处外突近达翅外缘 ..... 月望夜蛾 *C. sublunaris*
- 前翅亚端线在 7 脉处稍外突 ..... 塞望夜蛾 *C. syriaca*