



图 479 单齿秀夜蛾 *Apamea monoglypha* (Hufnagel)
♂ 外生殖器

庸秀夜蛾 *Apamea inexpecta* Sugi (图版 XXX-17)

Apamea inexpecta Sugi, 1963, Tines, 6: 12, fig. 9; (日本)

翅展 45mm。头、胸及前翅褐色，前翅部分带黑褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，中线模糊黑色，亚端线浅灰色锯齿形，两侧黑褐色，在 3、4 脉处强外突，线内方一列黑齿纹，剑纹大，褐灰色，舌形，环纹、肾纹浅褐黄色，前者大，斜圆形，两纹间暗褐色，外侧内侧的亚中褶处一黑纵纹与剑纹相连；后翅浅灰黄色，外半暗褐色，可见褐色中线；腹部赭黄色。

分布 湖南、福建；日本。

华秀夜蛾 *Apamea chinensis* (Leech) (图版 XXX-18)

Xylophasia chinensis Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 70. (中国西部: Chia-kou-ho)

Parastichtis chinensis: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 94. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 164, pl. 39d.

翅展 42mm。头、胸及前翅浅赭黄色，前翅散布黑褐点，基线、内线及外线均双线黑色，后者锯齿形，亚中褶基部一黑纵纹，剑纹较大，菱形，环纹扁斜，绿黄色，肾纹大，赭黄色，前、后各一云状褐斑，亚端线浅黄色，锯齿形，与外线间及端区带黑褐色，顶角赭黄色；后翅浅赭黄色，翅脉、外线与亚端线褐色，后者带状；腹部浅赭灰色。

分布 四川、云南。

毁秀夜蛾东方亚种 *Apamea aquila oriens* Warren (图版 XXX-19)

Apamea aquila Donzel, 1837, Ann. Soc. ent. Fr. 6: 476.

Parastichtis funerea ssp. *oriens* Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 165, pl. 39f. (中