



图 487 齿秀夜蛾 *Apamea cuneatoides* Poole ♂ 外生殖器

寄主 竹笋。

分布 河南、福建；日本。

#### 灵秀夜蛾 *Apamea unanimitis* (Hübner) (图版 XXX-31)

*Noctua unanimitis* Hübner, [1813], Samml. eur. Schmett. 4: pl. 120, fig. 556. (欧洲)

*Trachea unanimitis*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 184.

*Apamea unanimitis*: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 129.

翅展 32—38mm。头、胸赤褐色杂黑褐及灰色；前翅褐色，部分带黑褐色，翅脉微白，基线、内线均双线黑褐色，中室基部后方一黑纹，剑纹小，环纹大，斜椭圆形，肾纹外半及外缘白色，中线黑褐色，不明显，外线褐色，外侧衬灰色，线外侧一列黑点和一列白点，亚端线浅赭黄色，在 3、4 脉成外突齿；后翅褐灰色，端区黑褐色，腹部褐色。

寄主 禾本科植物。

分布 黑龙江、新疆；俄罗斯，欧洲。

多型种。手头标本与中亚类型相似。

#### 修秀夜蛾 *Apamea oblonga* (Haworth) (图版 XXXI-1)

*Noctua oblonga* Haworth, 1809, Lep. Brit. p. 188. (英国)

*Apamea oblonga*: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 128.

翅展 42mm。头、胸暗褐杂灰色；前翅暗褐带黑灰色，基线、内线均双线黑色，后者波浪形，后端内方一暗褐纹，剑纹黑色，环纹、肾纹浅褐色，中线模糊，外线灰白色锯齿形，亚端线灰白色，内侧一列黑褐齿形斑；后翅白色，端区微褐；腹部灰色。雄蛾