

Diomea cremata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 23. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 369. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 366. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 883.

翅展 25 mm。全体黑褐色；前翅基线白色外弯至 1 脉，内线仅前端现一白曲纹，中室后一白点，肾纹为模糊小白斑，外线前端为一白斑，其后为一列白点，亚端线为一列白点，端线亦为一列白点；后翅外线为一列白点，后端融合成一白曲纹，亚端线为一列白点，翅外缘一列白点。雄蛾抱器腹延伸为一长突，瓣端半部较窄（图 647）。

分布 黑龙江、河北、云南；日本，朝鲜，印度。

仿爱夜蛾属 *Apopestes* Hübner

Apopestes Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 275.

Type-species: *Noctua spectrum* Esper.

Spintherops Boisduval, 1840, Ind. Meth. p. 98.

喙发达，额微凸，上缘有一毛簇，下唇须向上伸，第二节有粗而密的毛，第三节向前伸，尖，前端微弯，雄蛾触角有纤毛丛；胸部及腹部鳞片平滑，下胸及足的腿节有绒毛；前翅前、后缘长度相近，顶角钝，外缘弧形。幼虫四对腹足俱全，身体细，取食蝶形花科植物，在细枝或枯叶中结薄茧化蛹。

吉仿爱夜蛾 *Apopestes centralasiae* Warren (图版 LIX-28)

Apopestea centralasiae Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 370, pl. 68b. (克什米尔；Kirgiz；Issykul；阿富汗)

翅展 60—66 mm。头部灰黄色杂黑褐色；颈板黑褐色，端部灰黄色，胸部背面灰黄色，翅基片基部浅黄色，有黑横纹，足灰黄色杂黑褐色，胫节端部及跗节各节间有灰黄斑；前翅灰黄色，布有黑褐细纹，前缘区色浅，基线黑褐色，外侧衬灰白色，自前缘脉外斜至中室后缘，内线黑褐色，锯齿形外弯，在前缘区及中室后较粗，中线黑褐色，在前缘区为一外斜纹，其后微弱，外斜至中室后缘，折角内斜并呈微波浪形，肾纹不明显，中有黑褐圈，外线黑褐色，在前缘脉上为一粗黑点，其后波浪形外弯，至 3 脉处内突达肾纹后端，折角后垂，亚端线灰白色，有间断，不规则波曲，在 2 脉后内弯，线内侧衬黑褐色，在亚中褶处有一黑褐斑，1 脉处有一黑褐小斑，翅外缘有一列黑点；后翅灰黄色微带褐色，端区色较暗，隐约可见黑褐色外线，缘毛浅褐黄色；腹部浅褐黄色。

寄主 苦豆子。

分布 新疆、宁夏、四川、西藏；克什米尔地区，中亚地区，阿富汗。