

寄主 香蒲、黑三棱等属；黄菖蒲。

分布 黑龙江；欧洲。

条锹额夜蛾 *Archanara aerata* (Butler) (图版 XXXVII-8)

Leucania aerata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 80. (日本)

Archanara aerata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 297. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 751. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 275.

翅展 41 mm。头、胸及前翅灰褐带黄赭色，前翅后半部色较暗，亚前缘脉基部、中室后缘及 1 脉基部有暗褐纹，环纹只现一暗褐点，肾纹隐约可见，其外围为黑色鳞片，外线只现一列黑点，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜，顶角有一暗褐内斜纹伸至外线折角处，翅外缘有一列黑点；后翅淡赭黄色；腹部灰褐色。

寄主 芦苇。

分布 黑龙江、山东；日本，欧洲。

干纹夜蛾属 *Staurophora* R. L.

Staurophora R. L., 1817, Jenaische Allgemeine Lit.-Ztg., 1: 386.

Type-species: *Phalaena celsia* Linnaeus.

Diacope Hübner, [1820] 1816, Verh. bek. Schmett. p. 204.

Celsia Stephens, 1829, Syst. Catal. Brit. Ins. p. 105.

Calotaenia Stephens, 1830, Ill. Brit. ent. p. 99.

Jaspidia Boisduval, 1840, Ind. Meth. 1: 33, 36.

Callitaenia Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Ind. Univ. p. 60.

喙发达，下唇须向上伸，第二节前缘有长毛，第三节短，向前伸，额平滑，有毛簇，雄蛾触角有纤毛丛；胸部主要是鳞片，前、后胸有小毛簇，胫节有长毛；腹部基部几节有毛簇，第三节上的最大。

种 检 索 表

前翅中带宽 干纹夜蛾 *Staurophora celsia*
前翅中带窄，间断 窄干纹夜蛾 *S. tenuis*

干纹夜蛾 *Staurophora celsia* (Linnaeus) (图版 XXXVII-9)

Phalaena Noctua celsia Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 507. (欧洲)

Calotaenia celsia: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 130—Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 138.