

腾夜蛾属 *Parhylophila* Hampson

Parhylophila Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 514.

Type-species: *Chloeophora celsiana* Staudinger.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部毛、鳞混杂，无毛簇；前翅外缘前半凹，中部外突，8、9、10脉共柄，无副室；后翅5脉发达，自中室下角稍前发出；腹部基节背面有一大鳞簇。

腾夜蛾 *Parhylophila celsiana* (Staudinger) (图版XXXIX-4)

Chloeophora celsiana Staudinger, 1887, Stett. ent. Zeit. 3: 177, pl. 10, fig. 1 (Raddefka)

Parhylophila celsiana: Hampson, 1912, Car. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 514. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 298. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 798. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 993.

翅展 25—34 mm。头部白色，触角褐色，下唇须外侧褐色；颈板白色；胸部绿色，翅基片外缘白色，后胸白色，有二绿点，下胸与足白色带褐色；前翅绿色，前缘白色，后缘基部有一白斑，其前缘弧形达1脉，外线白色，自前缘脉外弯至5脉后内弯，自3脉后内侧衬黑色，至1脉后黑色扩大，缘毛黑褐色，端部白色；后翅淡褐色，缘毛白色，近基部有一褐线；腹部白色带褐色。

分布 黑龙江、吉林、湖南；俄罗斯。

妆夜蛾属 *Ariola* Walker

Ariola Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 12: 768.

Type-species: *Ariola coelisigna* Walker.

喙发达，下唇须向前平伸，第二节端部上下缘饰毛较宽，第三节短，额光滑无突起，雄蛾触角线形；胸部主要被鳞片，无毛簇；前翅较长，有一细长副室；后翅3、4脉共柄，5脉发达，自中室下角稍前发出；腹部基节背面有一鳞簇。

妆夜蛾 *Ariola coelisigna* Walker (图版XXXIX-5)

Ariola coelisigna Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 12: 769. (斯里兰卡；沙捞越)

Ariola ransonneti Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 108, fig. 1.

Ariola coelisigna: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 516. —Gaede, 1937, in

Seitz, Macrolep. World 11: 425. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 22. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322.

翅展 23 mm。头、胸褐绿色；前翅前半一褐绿大斑，其后缘弧形并衬白色，翅的其余部分白色为主，后缘区大部带紫褐色，亚端区带墨绿色，亚端线白色波浪形，端线黑色，内侧一波浪形白线，此线与亚端线间暗褐色，端区各翅脉黑褐色；后翅暗棕褐色；腹部灰褐色。

分布 海南；印度，缅甸，斯里兰卡，马来西亚，菲律宾，新加坡，印度尼西亚。

翡夜蛾属 *Paracrama* Moore

Paracrama Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 54.

Type-species: *Nolasena dulcissima* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节很长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部鳞片与毛混生，无毛簇；腹部基节有毛簇；前翅顶角长方形，外缘曲度平稳，有副室。

翡夜蛾 *Paracrama dulcissima* (Walker) (图版 XXXIX-6)

Nolasena dulcissima Walker, 1863 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 76. (沙撈越)

Paracrama dulcissima: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 520. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 22. —Barlow, 1982, Moths SE Asia, p. 97. —Chen, 1982, Icon. net. Sin. 3: 322.




图 564 翡夜蛾 *Paracrama dulcissima* (Walker) ♂ 外生殖器

翅展 26—30 mm。头、胸及前翅绿色，额深棕色紫、白色，前翅前缘棕色，后缘基部有棕色斑，内、外线白色，外区前缘脉有一白纹，翅外缘在 2 脉处凹，端线棕色有一列黑点；后翅白色，端区带桃红色；腹部白色。雄蛾抱器腹延伸，钩形突短粗(图 564)。

分布 广东、广西；日本，印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚，大洋洲。

红衣夜蛾属 *Clethrophora* Hampson

Clethrophora Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 416.