

Type-species: *Cosmophila inconclusa* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节超过头顶，额无突起，上部有毛簇，复眼大，触角线形，有鬃毛；胸部主要被鳞片，后胸有一对金色鳞片簇；前翅外缘微曲，有一小副室；后翅中室长约为翅的 $1/3$ ，5脉发达，自中室下角发出。

金鳞夜蛾 *Sarobides inconclusa* (Walker) (图版 LXIII-3)

Cosmophila? inconclusa Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 77. (Borneo)

Capnodes rufescens Moore, 1877, Proc. zool. Soc. p. 612.

Sarobides inconclusa: Holloway, 1976, Moths Borneo p.38. —Barlow, Moths SE Asia p.112, pl.38, fig. 15.

翅展 30 mm。头部褐色，头顶赭红色，下唇须浅褐灰色；胸部背面浅黄色带赭红色，下胸浅黄色；前翅底色浅黄，大部带有赭红色及灰褐色，前缘区灰褐色，各横线不清晰，环纹与肾纹浅黄色，橙色边，肾纹前另有二浅黄点，均围以橙色边，环纹与肾纹之间及内线与外线之间灰褐色，外线隐约可见，黑色锯齿形外弯，两侧浅黄色，亚端线浅黄色，在 7 脉处外凸，中段弧形，两衬灰褐色，近翅外缘有一列黑褐短纵纹；后翅色似前翅，斑纹模糊，外线黑色，锯齿形外弯，有间断，缘毛灰褐色；腹部红褐色，腹部浅褐黄色。

分布 海南、云南；缅甸，印度，加里曼丹，所罗门群岛。

升夜蛾属 *Arsacia* Walker

Arsacia Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 259.

Type-species: *Arsacia saturatalia* Walker.

Midea Walker, 1863, List. Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 21.

Notocyma Snellen, 1872, Tijds. ent. 15: 67.

Amblyzancla Turner, 1936, Proc. R. Soc. Qd. 47: 34.

喙发达；下唇须向前平伸，第二节下缘饰密鳞，第三节短小，雄蛾触角线形；胸部被平滑鳞片；前翅顶角约呈直角形，外缘较直，雄蛾前翅后缘近基部及近端部各有鳞簇，7、8、9、10 脉共柄，无副室；后翅稍长，中室长，超过翅之半，腹部细长。

升夜蛾 *Arsacia rectalis* (Walker) (图版 LXIII-4)

Midea rectalis Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 21. (Sarawak)

Arsacia saturatalis Walker, [1866] 1865, ditto, 34: 1260.

Notocyma pruinosa Snellen, 1872, Tijds. ent. 15: 67.

Arsacia frontirufa Swinhoe, 1885, Proc. zool. Soc. p. 301.

Amblyzancla declivis Turner, 1936, Proc. R. Soc. Qd. 47: 34.
Arsacia saturatalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 567. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 16 mm。头部红棕色，下唇须向前平伸，第二节较宽扁，第三节短小；胸部背面红棕色，下胸赭黄色，前足胫节外侧黑色；前翅栗壳色，外线内方的前缘区桃红色，翅后缘近基部后突成齿形，近臀角处有鳞片簇，外线灰色，自近顶角处直线内斜至翅后缘近中部，线外方区域带有桃红色并布有黑色细点；后翅暗灰褐色；腹部灰褐色。

寄主 黄檀。
分布 广西、海南；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚。

肖金夜蛾属 *Plusiodonta* Guenée

Plusiodonta Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 359.
* Type-species: *Plusiodonta chalsytoides* Guenée.
Gaderu Walker, [1858], 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 12: 941.
Deva Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 12: 941.
Odontina Guenée, 1862, Notes Ile Reunion 2: G42.
Tafalla Walker, 1869, Char. undescr. Lep. Het. p. 42.
Tinnodoxa Nye, 1975, Generic names Moths World 1: 483.

喙发达；下唇须斜向上伸，第二节具粗鳞，达到或超过头顶，第三节直立，短小而光滑，有些雄蛾的触角具纤毛或成双栉形；胸部细长，无毛簇，足上鳞片平滑，前翅外缘中部略外曲成一不很明显的钝角，后缘在臀角到中部间内削，中部及臀角处各有一撮突出鳞片，前翅有金属色泽的光纹。幼虫第一及第二对腹足退化。

种 检 索 表

- 1. 前翅内区有金斑 纯肖金夜蛾 *Plusiodonta casta*
前翅内区无金斑 2
- 2. 前翅红棕色 褐肖金夜蛾 *P. auripicta*
前翅金色带褐 肖金夜蛾 *P. coelonota*

纯肖金夜蛾 *Plusiodonta casta* (Butler) (图版 LXIII-5)

Platydia casta Butler, 1878, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 54, pl. 38, fig. 1. (日本横滨)
Deva casta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384.
Plusiodonta casta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 860.