

前翅内外线后端不相遇 斜线关夜蛾 *A. dotata*

锈色关夜蛾 *Artena rubida* (Walker) (图版LIII-2)

Ophisma rubida Walker, 1863 1864, J. Linn. Soc., zool. 7: 179. (沙撈越)

Lagoptera rubida: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 417. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 472. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353.

Artena rubida: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 29.

翅展 70 mm。头、胸及前翅锈棕色，前翅中区前半色较浅，各横线棕色，内线后半不显，环纹为一黑棕点，肾纹棕色，前半有一白点，外线外斜至 5 脉后不显，亚端线直，外侧白色，端线波浪形，内侧各翅脉现黑棕短条，外侧现一列白点；后翅黑褐色，中带蓝白色，较直，端区有蓝白色，缘毛赭黄色；腹部黑褐色。

分布 广东、海南；印度，马来西亚。

斜线关夜蛾 *Artena dotata* (Fabricius) (图版LIII-3)

Noctua dotata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 55. (India Orientali)

Lagoptera dotata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 418. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 472. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353.

Artena dotata: Barlow, 1982, Moths SE Asia p.101.

翅展 57—60 mm。头、胸及前翅棕色，前翅布有黑褐细点，外区色浓，端区灰白色，内线外斜至后缘中部，环纹为一黑棕点，肾纹为二黑圆斑，外线微波浪形，后端达臀角，内线、外线均衬灰色，亚端线直，黑棕色，端线双线波浪形；后翅黑棕色，中部一蓝白弯带，外缘有蓝白色，缘毛黄白色，中段有褐色；腹部灰棕色。

寄主 柑橘类。

分布 陕西、河南、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、台湾、广东、四川、贵州、云南；印度，缅甸，新加坡。

安钮夜蛾属 *Ophiusa* Ochsenheimer

Ophiusa Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 93.

Type-species: *Phalaena tirhaca* Cramer.

Anua Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1788.

Stenopsis Mabille, 1880, C. R. Soc. Ent. Belg. 23: 107.

Subanua Berio, 1959, Bull. Soc. Ent. Ital. 89: 316.

Peranua Berio, 1959, Bull. Soc. Ent. Ital. 89: 316.

Perophiusa Berio, 1959, Bull. Soc. Ent. Ital. 89: 316.