

前翅外线、亚端线后半不带肉色 铅色砧夜蛾 *A. chalybsa*

铅色砧夜蛾 *Atacira chalybsa* (Hampson) (图版XIII-29)

Penicillaria chalybsa Hampson, 1891, Ill. Het. Colln. Br. Mus. 16: 80, pl. 146, fig. 1. (印度)

Eutelia chalybsa: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 36. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 90. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 335.

翅展 25 mm 左右。头部白色，下唇须基部黑色，第二节端部一黑点；胸部灰色，颈板基部一三角形黑斑；前翅灰色，基线前端为一小黑斑，在中室为黑点，内线黑色外弯，中线黑色较粗，外斜至肾纹折向内斜，肾纹黑色白边，椭圆形，外线双线黑色，波浪形，前半外弯，亚端线白色，前端内侧一三角形黑斑，3—6 脉间一黑斑，约呈斜三角形，端线为一列新月形黑点；后翅灰色带褐色，基部及后缘区较黄白，外缘微黑，亚端线黑色衬白，两线均只后半可见。

分布 江西、福建、四川；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚。

戈尾砧夜蛾 *Atacira grabczewskii* (Püngeler) (图版XIII-30)

Eutelia grabczewskii Püngeler, 1904, D. ent. Zeit. Iris, 16: 289, pl. 6, fig. 5. (日本)

Eutelia grabczewski Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 37, pl. 174, fig. 28.

Eutelia grabczewskii: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 131, pl. 100, fig. 2183. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 789.

翅展 26 mm。头部与胸部铅灰色，下唇须基部黑色，其余白色带桃红色，额白色，触角基部有红色毛簇；前翅铅灰色，基线黑色，外斜，内线黑色，波浪形，强外弯，有间断，环纹小，圆形，有白圈，肾纹褐色微带绿色，中线黑色模糊，后半内斜，外线双线黑色，有间断，线间浅赭色，内侧有一列浅赭纹，外弯至 4 脉后内斜，亚端线白色，前端内侧有一暗灰绿斑，在中褶处有一黑色三角形斑，其后有一小黑斑及浅褐带；后翅灰色带绿褐色，臀角处有 2 黑纹。

分布 福建；日本。

波尾夜蛾属 *Phalga* Moore

Phalga Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 375.

Type-species: *Phalga sinuosa* Moore.

喙发达，很小，下唇须向上伸，第二节约达额中部，第三节长，额平滑，上方有毛簇，雄蛾触角下半部轴宽扁，双栉形，基部有一大鳞；前胸有一扁形毛簇，后胸有成对毛簇；前翅顶角较圆，外缘锯齿形，臀角处内削；静止时腹部举起。雄蛾抱器瓣背侧有