

线黑色；后翅褐白色；腹部褐色。

分布 云南；斯里兰卡。

白斑委夜蛾 *Athetis albisignata* (Oberthür) (图版 XXXV-25)

Caradrina albisignata Oberthür, 1879, Diat. Lep. Askold. p. 14. (Askold)

Elydna albisignata; Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 172.

Athetis albosignatu; Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 131.

翅展 26—36 mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，前翅端区色暗，各横线均黑色，基线波浪形，中线模糊，外线外方各翅脉均有一黑纹，环纹不显，肾纹微黑，中有一白点，亚端线模糊，翅外缘一列白点；后翅褐白色，缘毛白色。

分布 黑龙江、陕西；日本，朝鲜，俄罗斯。

门斑委夜蛾 *Athetis atripuncta* (Hampson) (图版 XXXV-26)

Elydna atripuncta Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 175, pl. 141, fig. 21. (斯里兰卡)

Elydna atripuncta; Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 37 mm。头部乳白色，触角干、额及下唇须暗褐色；胸部乳白色带赭黄色，布有少许黑色细点，足胫节与跗节褐色；前翅粉赭黄色，散布黑色细点，端区带褐色，内线褐色，波浪形，在后缘区呈双线，在 1 脉处外凸，肾纹黑色圆形，外线褐色，自前缘脉后细锯齿形外弯至 2 脉，在亚中褶处内凸，近达内线，在 1 脉处外凸，亚端线较模糊，在前缘脉上为一黑点，其后不规则锯齿形，在 7 脉处外凸，在中褶与亚中褶处内弯，近翅外缘有一列黑点，缘毛赭黄色，中有一列黑褐点；后翅褐黄色；腹部赭黄色，布有少许暗褐细点。

分布 云南；斯里兰卡。

阴委夜蛾 *Athetis funesta* (Staudinger) (图版 XXXV-27)

Caradrina (Hydrilla) funesta Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 256. (Askold)

Athetis funesta; Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 359.

翅展 33 mm。头、胸黑褐色杂灰色；前翅黑褐色，内线灰色，环纹为一黑斜点，边缘灰色，肾纹黑色新月形，外线黑色细锯齿形，亚端线灰色，内侧衬黑褐色，中段外弯，翅外缘一列黑纹；后翅灰色带黑褐色；腹部黑褐色。雄蛾抱器瓣端部有一片状突，其背缘锯齿形，阳茎长，有齿形角状器（图 526）。

分布 黑龙江、山西；日本，俄罗斯。