

后端外斜至臀角，翅外缘一列黑点；后翅浅褐色；腹部浅红褐色。

分布 西藏；锡金，印度。

钝委夜蛾 *Athetis obtusa* (Hampson) (图版 XXXV - 10)

Caradrina obtusa Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 15, 79, pl. 145, fig. 6. (印度)

Athetis obtusa: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 344. — Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 326. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 249.

翅展 24 mm 左右。头部灰白色带淡褐色，下唇须第二节外侧有黑条；胸部淡褐色有黑点，前翅淡褐色，密布黑点，端区色较深，基线黑色，波浪形，在亚前缘脉及中室处各成一黑点，内线黑色，波浪形，前端粗，环纹为一黑圆点，中线黑色，模糊，肾纹大，“8”字形，有模糊的黑色轮廓，外线双线黑色，锯齿形，亚端线灰白色，锯齿形，内侧有一些黑纹，端线为一列黑点；后翅白色，前缘及顶角微带褐色；腹部褐色，臀毛簇褐黄色。

分布 广东；印度，大洋洲。

连委夜蛾 *Athetis cognata* (Moore) (图版 XXXV - 12)

Graphiphora cognata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 119 (大吉岭)

Athetis cognata: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 347. — Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 326.

翅展 22 mm。头、胸灰色杂褐色；前翅灰色带赭色，布有黑褐细点，端区带黑褐色，基线、内线及外线黑色，环纹为一黑点，肾纹为一小黄斑，前方一白点，中线黑褐色，外线在 7 脉后锯齿形，在翅脉上为黑纹，线外方另一黑褐线，亚端线不清晰，内侧衬黑褐色，端线黑色；后翅白色，前缘区、端区及翅脉褐色；腹部褐灰色。

分布 云南；锡金，印度。

柔委夜蛾 *Athetis placida* (Moore) (图版 XXXV - 13)

Radinacra placida Moore, [1884] 1884—87, Lep. Ceyl. 3: 30, pl. 147, fig. 4. (斯里兰卡)

Athetis placida: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 347. — Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 326, pl. 281. — Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 2: 766.

翅展 25 mm。头、胸浅红棕杂灰色；前翅灰色带红棕色并有暗褐细点，基线及中线暗褐色，内线不清晰，环纹为一黑点，肾纹模糊，暗褐色，内外缘凹，外侧有黄点，外围另有黄白细点，外线黑褐色锯齿形，亚端线浅赭黄色，锯齿形，内侧暗褐色，翅外缘一列黑点；后翅白色，顶角区微褐；腹部浅红褐带灰色。

分布 海南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲等。