

线黑色；后翅褐白色；腹部褐色。

分布 云南；斯里兰卡。

白斑委夜蛾 *Athetis albesignata* (Oberthür) (图版 XXXV - 25)

Caradrina albesignata Oberthür, 1879, Diat. Lep. Askold. p. 14. (Askold)

Elydna albesignata; Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 172.

Athetis albesignata: Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 131.

翅展 26—36 mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，前翅端区色暗，各横线均黑色，基线波浪形，中线模糊，外线外方各翅脉均有一黑纹，环纹不显，肾纹微黑，中有一白点，亚端线模糊，翅外缘一列白点；后翅褐白色，缘毛白色。

分布 黑龙江、陕西；日本，朝鲜，俄罗斯。

门斑委夜蛾 *Athetis atripuncta* (Hampson) (图版 XXXV - 26)

Elydna atripuncta Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 175, pl. 141, fig. 21. (斯里兰卡)

Elydna atripuncta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 37 mm。头部乳白色，触角干、额及下唇须暗褐色；胸部乳白色带赭黄色，布有少许黑色细点，足胫节与跗节褐色；前翅粉赭黄色，散布黑色细点，端区带褐色，内线褐色，波浪形，在后缘区呈双线，在 1 脉处外凸，肾纹黑色圆形，外线褐色，自前缘脉后细锯齿形外弯至 2 脉，在亚中褶处内凸，近达内线，在 1 脉处外凸，亚端线较模糊，在前缘脉上为一黑点，其后不规则锯齿形，在 7 脉处外凸，在中褶与亚中褶处内弯，近翅外缘有一列黑点，缘毛赭黄色，中有一列黑褐点；后翅褐黄色；腹部赭黄色，布有少许暗褐细点。

分布 云南；斯里兰卡。

阴委夜蛾 *Athetis funesta* (Staudinger) (图版 XXXV - 27)

Caradrina (Hydrilla) funesta Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 256. (Askold)

Athetis funesta: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 359.

翅展 33 mm。头、胸黑褐色杂灰色；前翅黑褐色，内线灰色，环纹为一黑斜点，边缘灰色，肾纹黑色新月形，外线黑色细锯齿形，亚端线灰色，内侧衬黑褐色，中段外弯，翅外缘一列黑纹；后翅灰色带黑褐色；腹部黑褐色。雄蛾抱器瓣端部有一片状突，其背缘锯齿形，阳茎长，有齿形角状器（图 526）。

分布 黑龙江、山西；日本，俄罗斯。




图 526 阴委夜蛾 *Athetis funesta* (Staudinger) ♂ 外生殖器

复委夜蛾 *Athetis praetexta* (Swinhoe) (图版XXXV-28)

Caradrina praetexta Swinhoe, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 15: 152. (印度)

Athetis praetexta: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 316. — Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 324. — Roepke, 1948, Tijd. ent. 89: 219.

翅展 32—35 mm。头部与胸部褐灰色，下唇须外侧灰黑色；前翅灰白带浅褐色，基线与内线均双线黑褐色，线间色浅，环纹为一黑点，肾纹黑棕色，中部内凹，中线粗，黑棕色，外线双线黑棕色，后半内斜，亚端线褐白色，内侧衬褐色，端区带有黑棕色；后翅褐灰色；腹部灰色带黑褐色。

分布 西藏；印度。

逸夜蛾属 *Caradrina* Ochsenheimer

Caradrina Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 80.

Type-species: *Phalaena morpheus* Hufnagel.

Eremodrina Boursin, 1937, Ent. Rdsch. 54: 422.

Hymenodrina Berio, 1957, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Giac. Doria. 59: 420.

Paradrina Boursin, 1937, Ent. Rdsch. 54: 421.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶。前缘饰鳞，第三节短，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被毛和毛状鳞，前胸有毛簇；前翅稍窄，有一副室；后翅 5 脉弱，自中室横脉中部发出；腹部无毛簇。

雄蛾抱器瓣端部常分化为尖突或二叉。