

石委夜蛾 *Athetis lapidea* Wileman (图版 XXXV-14)

Athetis? lapidea Wileman, 1911. Trans. ent. Soc. p. 218 (日本大和)

Athetis lapidea: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 175. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 766. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 249.

翅展 27 mm。头、胸灰黄褐色；前翅浅黄褐色，端区大部黑褐色，基线、内线黑色波浪形，环纹黑色，肾纹不显，中线黑色波浪形，外线黑色，前段为一斜纹，其后锯齿形，端线为一列黑长点；后翅浅褐色，端线为一列深褐点；腹部黄褐色。

分布 四川；日本。

淡委夜蛾 *Athetis flavitincta* Hampson (图版 XXXV-15)

Athetis flavitincta Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 356, pl. 130, fig. 29 (印度)

Athetis flavitincta: Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 326.

翅展 30 mm。头部灰白色杂以赭褐色，下唇须外侧褐黑色；胸部背面灰白色杂有褐色，足跗节褐黑色，各节间有白色环纹；前翅白色带红赭色，并布有褐色细点，端区带有黑褐色，基线仅在前缘脉上现一黑点，内线不明显，微黑双线，但在前缘脉上为明显黑点，微波浪形外斜，环纹不显，中线模糊，黑褐色，波浪形，自前缘脉外斜至中室下角再折向内斜，肾纹窄，浅赭黄色，黑褐边，外线不明显，双线黑色，内一线在前缘脉上为一黑点，细锯齿形自前缘脉后外弯，在 4 脉后内斜，外区前缘脉上有三个白点，亚端线不明显，赭白色，细波浪形，缘毛灰黄色杂以褐色，基部有一黄白线；后翅白色带有褐色，翅脉及端区褐色，缘毛白色，中有一褐线，但不达臀角；腹部淡红褐色。

分布 西藏；印度。

后委夜蛾 *Athetis gluteosa* (Treitschke) (图版 XXXV-16)

Caradrina gluteosa Treitschke, 1835, Schmett. Eur. 10 (2): 80. (Shrmien)

Athetis gluteosa: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 360. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 765.

翅展 25—36 mm。头、胸及前翅浅褐灰色，前翅基线、内线褐色，后者波浪形，环纹为一黑褐点，肾纹小，褐色，中线暗褐色，后半波浪形，外线黑褐色锯齿形，齿尖为点状，亚端线灰白色，内侧暗褐色，翅外缘一列黑褐纹；后翅与腹部白色微带褐色。

寄主 低矮草本植物。

分布 黑龙江、青海、四川、西藏；日本，朝鲜，蒙古，中亚地区，欧洲。

乡委夜蛾 *Athetis thoracica* (Moore) (图版 XXXV-17)

Radinacra thoracica Moore, 1884, Lep. Ceyl. 3: 31. (斯里兰卡)