

Leucocosmia nonagrica: Zimmerman, 1958, Ins. Hawaii, 7: 328. —Robinson, 1975, Macrolep. Fuji & Rotuma p. 128.

Athetis thoracica: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 141.

翅展 25—30 mm。头、胸浅褐黄色；前翅内半浅褐黄带橙色，外半浅褐色有紫色感，基线不显，内线隐约可见，环纹为一黑点，肾纹不清晰，暗褐色，中线暗褐色，模糊，外线、亚端线浅黄色，两线内侧均有少许暗褐点，翅外缘一系列小黑点；后翅黄白色，基部微黄；腹部深棕色。雌蛾体小，前后翅基部不带黄色。

寄主 鸭跖草、马齿苋、甘薯、烟草、山茶等属。

分布 海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡，印度尼西亚，大洋洲。

农委夜蛾 *Athetis nonagrica* (Walker) (图版 XXXV - 18)

Curgia nonagrica Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc., zool. 7: 166. (沙撈越)

Leucocosmia nonagrica: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 178.

Elydna nonagrica: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273. —Holloway, 1989, Malay, Nat. J. 42: 142.

翅展 30 mm。头部浅黄褐色；胸部褐色；前翅内半浅褐黄色，外半带有暗褐色，基线黑色外斜，或间断为点列，内线不明显，双线黑色大波浪形，环纹为一黑点，肾纹不明显，外侧有浅褐黄纹，中线模糊黑色，外线、亚端线浅黄色，外线内方有一细褐线，与亚端线间在 4—5 间有一褐斑，外线外方的翅脉带黑褐色；后翅白色微褐，翅脉及端区深褐色；腹部黑棕色。

寄主 鸭跖草、马齿苋等属。

分布 海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡，马来西亚，印度尼西亚，大洋洲。

沙委夜蛾 *Athetis reclusa* (Walker) (图版 XXXV - 19)

Prodenia reclusa Walker, 1862, J. Linn. Soc. Lond., 6: 185. (沙撈越)

Elydna reclusa: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 164.

Athetis reclusa: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 140.

翅展 26 mm。头、胸及前翅暗褐灰色，前翅基线、内线、中线及外线黑色，除中线外均锯齿形，环纹为一黑点，肾纹褐黑色，中线粗，亚端线不明显，浅黄色锯齿形，内侧暗褐色，翅外缘一系列黑点；后翅白色，顶角及端区前半褐色；腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣宽，端缘钝圆，抱钩微弯，端尖（图 525）。

分布 海南、广西；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚，大洋洲。