

秘委夜蛾 *Athetis pellicea* (Swinhoe) (图版 XXXV-22)

Plecoptera pellicea Swinhoe, 1903, Ann. Mag. nat. Hist. 7 (11): 507. (泰国)

Elydna pellicea: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 174. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 180. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 44.

翅展 35 mm 左右。头部与胸部淡紫灰色，微带褐色，下唇须一、二节外侧大部黑色，翅基片有黑点，足黑褐色，有淡黄环；前翅淡紫灰色，微带赭色，散布黑褐细点，基线仅在前缘脉上现一黑点，内线在前缘脉上为一黑点，其后隐约可见黑色，间断，在中室后稍显，前缘区中部有黑棕色近三角形斑，其后端稍外弯突，其后方在亚中褶处有一黑棕色小斑，外线不明显，黑褐色，锯齿形外弯至亚中褶，折向后垂，亚端线隐约可见波浪形，外线与亚端线间的前缘区有一黑棕色斗形斑，翅外缘一系列黑褐点，缘毛褐色，基部黄色；后翅褐赭色，缘毛黄色；腹部褐色。

分布 海南；泰国。

灰委夜蛾 *Athetis cinerescens* (Motschulsky) (图版 XXXV-23)

Cosmia cinerescens Motschulsky, 1860, Et. Ent. 9: 34. (日本)

Radinacra palpalis Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 161.

Elydna cinerescens: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 171.

Radinacra cinerescens: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 230.

Athetis cinerescens: Sugi, 765, in Inoue, Moths Jap. 1: 765.

翅展 27 mm。头部灰色杂褐色；胸部灰色杂白色；前翅灰色带褐色并布有黑褐细点，基线、内线及外线均黑色，内线波浪形，外线锯齿形，齿尖为黑点，环纹为一黑点，肾纹黑色，内、外缘有几个白点，亚端线隐约可见锯齿形，内侧黑褐色，中段外弯，翅外缘一系列黑点；后翅褐白，端区暗褐色；腹部灰色杂褐色。

分布 黑龙江、湖北；日本。

白肾委夜蛾 *Athetis renalis* (Moore) (图版 XXXV-24)

Radinacra renalis Moore, 1884, Lep. Ceyl. 3: 30, pl. 147, fig. 4a. (斯里兰卡)

Caradrina renalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 265.

Elydna renalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 171. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 180.

翅展 26 mm。头、胸及前翅褐色杂灰色，前翅基线，内线及外线均黑色，环纹为一黑点，边缘有少许白色，肾纹小，白色，前方一白点，后内方一小白点，后外方二白点，中线褐黑色，模糊，外线外方翅脉上均有一黑点，亚端线灰色，内侧衬黑褐色，端