

图 525 沙委夜蛾 *Athetis reclusa* (Walker)

♂ 外生殖器

倭委夜蛾 *Athetis stellata* (Moore) (图版 XXXV-20)*Graphiphora stellata* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 119. (大吉岭)*Elydna truncipennis* Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 168, text fig. 59.*Athetis stellata*: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 767.

翅展 28—34 mm。头、胸及腹部灰白带褐色；前翅灰褐色，端区暗褐色，基线、内线、中线及外线均黑色，基线、内线直，两线间在亚中褶有一黑点，中室处一白点，环纹为一黑点，肾纹为一黄白点，肾纹前方一白点，后方二白点，中线粗而模糊，外线外方各翅脉上有细黑纹，亚端线黑褐色粗而模糊，端线黑色；后翅黄白带褐色，端区色暗；腹部褐灰色。

分布 福建、四川、西藏；日本，朝鲜，锡金，印度，斯里兰卡。

线委夜蛾 *Athetis lineosa* (Moore) (图版 XXXV-21)*Dadica lineosa* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 349. (印度)*Elydna lineosa*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.*Athetis lineosa*: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Hap. 1: 768

翅展 27—40 mm。头部灰褐色；胸部褐色；前翅浅褐色，翅脉有暗褐纹，各横线均黑色，环纹为一黑点，肾纹为一白点，前方有一白点，中线粗而模糊，亚端线不清晰；后翅灰褐色，缘毛黄白色，雄蛾后翅反面的前缘区有后向的鳞片丛，亚前缘脉上的鳞片列成脊状；腹部褐灰色。

分布 河北、河南、浙江、湖北、湖南、福建、海南、广西、四川、云南；日本，印度。