

石委夜蛾 *Athetis lapidea* Wileman (图版 XXXV-14)

Athetis? lapidea Wileman, 1911. Trans. ent. Soc. p. 218 (日本大和)

Athetis lapidea: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 175. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 766. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 249.

翅展 27 mm。头、胸灰黄褐色；前翅浅黄褐色，端区大部黑褐色，基线、内线黑色波浪形，环纹黑色，肾纹不显，中线黑色波浪形，外线黑色，前段为一斜纹，其后锯齿形，端线为一列黑长点；后翅浅褐色，端线为一列深褐点；腹部黄褐色。

分布 四川；日本。

淡委夜蛾 *Athetis flavitincta* Hampson (图版 XXXV-15)

Athetis flavitincta Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 356, pl. 130, fig. 29 (印度)

Athetis flavitincta: Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 326.

翅展 30 mm。头部灰白色杂以赭褐色，下唇须外侧褐黑色；胸部背面灰白色杂有褐色，足跗节褐黑色，各节间有白色环纹；前翅白色带红赭色，并布有褐色细点，端区带有黑褐色，基线仅在前缘脉上现一黑点，内线不明显，微黑双线，但在前缘脉上为明显黑点，微波浪形外斜，环纹不显，中线模糊，黑褐色，波浪形，自前缘脉外斜至中室下角再折向内斜，肾纹窄，浅赭黄色，黑褐边，外线不明显，双线黑色，内一线在前缘脉上为一黑点，细锯齿形自前缘脉后外弯，在 4 脉后内斜，外区前缘脉上有三个白点，亚端线不明显，赭白色，细波浪形，缘毛灰黄色杂以褐色，基部有一黄白线；后翅白色带有褐色，翅脉及端区褐色，缘毛白色，中有一褐线，但不达臀角；腹部淡红褐色。

分布 西藏；印度。

后委夜蛾 *Athetis gluteosa* (Treitschke) (图版 XXXV-16)

Caradrina gluteosa Treitschke, 1835, Schmett. Eur, 10 (2): 80. (Shrmien)

Athetis gluteosa: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 360. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 765.

翅展 25—36 mm。头、胸及前翅浅褐灰色，前翅基线、内线褐色，后者波浪形，环纹为一黑褐点，肾纹小，褐色，中线暗褐色，后半波浪形，外线黑褐色锯齿形，齿尖为点状，亚端线灰白色，内侧暗褐色，翅外缘一列黑褐纹；后翅与腹部白色微带褐色。

寄主 低矮草本植物。

分布 黑龙江、青海、四川、西藏；日本，朝鲜，蒙古，中亚地区，欧洲。

乡委夜蛾 *Athetis thoracica* (Moore) (图版 XXXV-17)

Radinacra thoracica Moore, 1884, Lep. Ceyl. 3: 31. (斯里兰卡)

Leucocosmia nonagrica: Zimmerman, 1958, Ins. Hawaii, 7: 328. —Robinson, 1975, Macrolep. Fuji & Rotuma p. 128.

Athetis thoracica: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 141.

翅展 25—30 mm。头、胸浅褐黄色；前翅内半浅褐黄带橙色，外半浅褐色有紫色感，基线不显，内线隐约可见，环纹为一黑点，肾纹不清晰，暗褐色，中线暗褐色，模糊，外线、亚端线浅黄色，两线内侧均有少许暗褐点，翅外缘一系列小黑点；后翅黄白色，基部微黄；腹部深棕色。雌蛾体小，前后翅基部不带黄色。

寄主 鸭跖草、马齿苋、甘薯、烟草、山茶等属。

分布 海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡，印度尼西亚，大洋洲。

农委夜蛾 *Athetis nonagrica* (Walker) (图版 XXXV - 18)

Curgia nonagrica Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc., zool. 7: 166. (沙捞越)

Leucocosmia nonagrica: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 178.

Elydna nonagrica: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273. —Holloway, 1989, Malay, Nat. J. 42: 142.

翅展 30 mm。头部浅黄褐色；胸部褐色；前翅内半浅褐黄色，外半带有暗褐色，基线黑色外斜，或间断为点列，内线不明显，双线黑色大波浪形，环纹为一黑点，肾纹不明显，外侧有浅褐黄纹，中线模糊黑色，外线、亚端线浅黄色，外线内方有一细褐线，与亚端线间在 4—5 间有一褐斑，外线外方的翅脉带黑褐色；后翅白色微褐，翅脉及端区深褐色；腹部黑棕色。

寄主 鸭跖草、马齿苋等属。

分布 海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡，马来西亚，印度尼西亚，大洋洲。

沙委夜蛾 *Athetis reclusa* (Walker) (图版 XXXV - 19)

Prodenia reclusa Walker, 1862, J. Linn. Soc. Lond., 6: 185. (沙捞越)

Elydna reclusa: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 164.

Athetis reclusa: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 140.

翅展 26 mm。头、胸及前翅暗褐灰色，前翅基线、内线、中线及外线黑色，除中线外均锯齿形，环纹为一黑点，肾纹褐黑色，中线粗，亚端线不明显，浅黄色锯齿形，内侧暗褐色，翅外缘一系列黑点；后翅白色，顶角及端区前半褐色；腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣宽，端缘钝圆，抱钩微弯，端尖（图 525）。

分布 海南、广西；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚，大洋洲。