

缘一列黑点；后翅白色微褐，端区暗褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣端半部宽，背缘凹，抱钩弯爪状，阳茎有棘形角状器（图 523）。

分布 河北；日本，欧洲。

北委夜蛾 *Athetis tristis* (Bremer) (图版 XXXV-6)

Caradrina tristis Bremer, 1861, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 3: 485. (Ussuri, Ema)

Proxenus tristis: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 437.

Radinogoes tristis: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 216. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World p.183.

翅展 28 mm。头部白色，带有浅褐色，下唇须第一、二节外侧黑褐色，第二节端部及第三节灰白色；胸部背面淡褐灰色，足跗节各节间有灰白环；前翅赭白色，布有褐色细点，基线不显，内线隐约可见，暗褐色，波浪形，环纹为一黑色纵长纹，肾纹仅内、外缘现黑色新月形纹，外线不明显，黑褐色，锯齿形，在 4 脉后内弯，亚端线不显，翅外缘有一列黑点；后翅白色，翅脉微带褐色，端线褐色；腹部白色带有褐色。

分布 黑龙江；西伯利亚，克什米尔地区。

碎委夜蛾 *Athetis delecta* (Moore) (图版 XXXV-7)

Caradrina delecta Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 349, pl. 38. fig. 15. (大吉岭)

Athetis delecta: Hampson 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 313. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 249.

翅展 28 mm。头、胸及前翅灰白色，头、胸杂有褐、黑色，前翅微带褐色，端区色暗，基线、内线、中线及外线黑色，内、中线波浪形，环纹及肾纹内半为三个黑点，肾纹外半为四个黑点，均围以白色，外线外方各翅脉均有一黑点，亚端线白色，直线内斜，翅外缘一列黑点，内侧有一列白点；后翅白色，翅脉及端区带褐色；腹部白色带褐色。

分布 江苏、西藏；印度。

合委夜蛾 *Athetis immixta* Warren (图版 XXXV-8)

Athetis immixta Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 325, pl. 28k. (锡金)

翅展 35 mm。头部与胸部灰褐色杂有少许黑褐色，下唇须第一、二节外侧黑褐点较密；前翅灰褐色，布有黑褐细点，内线黑色，微波浪形，自前缘脉至中室后，内线黑色，自前缘脉外斜至中室，折角向后并呈波浪形，环纹只现一黑点，边缘微衬黄白色，肾纹较小，褐色，外围有黄白点，中线褐色模糊，微波浪形，外线不清晰，黑褐色，锯齿形，外侧衬黄白色，自前缘脉外弯至 3 脉，其后内弯，亚端线不清晰，在 6、7 脉处