

端部及第三节灰色；胸部黑棕色杂有白色；前翅灰褐色，后缘区近基部有一约呈斜方形的黄边黑斑，环纹只现一黑点，肾纹略呈三角形，黑色黄边，前方在前缘脉上有一黑点，后方有一大黑斑，由黄线分割，其内缘波浪形，其后另一小黑斑，外线双线灰黄色，自前缘脉后外弯至3脉，内侧有一列小黑斑，多呈圆形，外侧有一列稍大黑斑，不规则形，均有黄边，翅外缘有一列黑点；后翅灰褐色，外半部色暗；腹部暗灰色。雌蛾体大，前翅基部及中室黑色，内线与中线黄白色，曲折，将黑色部分分割成不规则形块，外区斑纹似雄蛾，但较粗大。

分布 四川、云南；缅甸，印度，孟加拉国，巴基斯坦。

波谷夜蛾 *Anoba sinuata* (Fabricius) (图版 LX-27)

Noctua sinuata Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 611. (印度)

Athyra intorta Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 150, pl. 8, fig. 13.

Baniana intorta: Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: pl. 163, fig. 3. —Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 515.

翅展 28 mm。头部与颈板黑褐色；胸部与前翅灰色，前翅基部有一黑褐色斑，位于中室基部后方，其内缘直，外缘中部外突，后端稍外斜，达翅后缘，外线黑色，自前缘脉内斜至5脉折向内达中室下角，与此处一黑斑相合，再折向后行并稍波曲，外线外方带有黑色，向外渐成褐色，亚端线隐约可见，黑褐色，不规则波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅黑褐色，基部色较浅；腹部灰色。

分布 海南；印度，非洲。

盾夜蛾属 *Athyra* Hübner

Athyra Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 267.

Type-species: *Phalaena adjutrix* Cramer.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，斜向前伸，额光滑无突起，上部有一尖形鳞簇，触角线形，复眼大，圆形；胸部无毛簇，雄蛾前足胫节饰长毛，中足胫节或具刺；前翅顶角稍尖。

种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 黑斑盾夜蛾 *Athyra chinensis*
雄蛾触线形 泉盾夜蛾 *A. bubo*

泉盾夜蛾 *Athyra bubo* Geyer (图版 LX-23)

Athyra bubo Geyer, 1832, Zutr. 4: 13, pl. 110, figs. 633—634. (爪哇)

Hypaetra bubo: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 508, fig. 283.

Athyra bubo: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 34, fig. 215.

Axatha bobo: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 358. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1017.

翅展 45 mm。头部紫灰褐色，雄蛾触角线形，复眼后下方有一黄白斑，下唇须外侧大部黑色；胸部背面紫灰褐色，足黑褐色杂有少许灰白色，前足胫节外侧有二黄白斑，胫节端部黄白色，中、后足胫节距及各跗节有明显白斑；前翅淡紫灰色，基部及外区色稍紫，前缘区近基部有一小黑斑，内线为一向后渐宽的黑棕色带，其内缘凹，在中室处稍间断，环纹只现一黑点，中线双线黑棕色，波浪形，自中室至翅后缘，肾纹界限不清，约呈新月形，后端灰白色，外方有一略呈三角形的黑棕色斑，其后端内钩绕过肾纹，斑前方有较宽黑棕色，前缘脉上有几个黑斑，亚端线黑棕色，锯齿形，其中段外侧微带暗褐色；后翅淡褐色，端区色暗，近臀角有一锯齿形白纹，顶角外的缘毛间有白色，臀角外的缘毛白色；腹部淡褐灰色，腹两侧各有一列黄白斑，腹面褐灰色。

分布 广西、云南；印度尼西亚。

黑斑盾夜蛾 *Athyra chinensis* (Warren) (图版 LX-24)

Hypaetra chinensis Warren, 1907, in Seitz, Macrolep. World 3: 377, pl. 69c. (中国)

Anereuthina chinensis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 142, pl. 14, fig. 275.

翅展 46 mm 左右。头部与胸部暗褐色，雄蛾触角双栉形，触角基部杂赭黄色，足跗节有赭黄色斑；前翅淡褐灰色带有淡紫色调，中线与外线间带红棕色，基线为二黑小斑，位于中室前后，前一斑较大，近三角形，内线自前缘脉至中脉为一外斜黑条，其后为一近三角形大黑斑，其边缘稍曲，均衬白色，内线内侧在中室处衬紫褐色，环纹为一黑点，中线红棕色，不规则波浪形，内线与中线间赭白色，中室下角有一黑点，中线前端外方有一近方形小黑斑，外线黑色，起自 8 脉，中段膨大成一孟形大黑斑，在 2—4 脉间缩成内突钩形，大斑内侧衬白色，在 2 脉后为波曲黑线，外侧在 3 脉后带红棕色，亚端线黑色，间断为不整齐锯齿形，亚端区前缘脉上有四个赭黄点，端区带有黑褐色，端线赭黄色，内侧衬黑褐色，缘毛黑褐色；后翅暗褐色，亚端线隐约可见；腹部灰褐色。

分布 江西。

旬夜蛾属 *Eurogramma* Hampson

Eurogramma Hampson, 1926, Descr. New Gen. & Spec. Noct. Br. Mus. p. 498.

Type-species: *Talapa obliquilineata* Leech.