

Hypaetra bubo: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 508, fig. 283.

Athyra bubo: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 34, fig. 215.

Axatha bobo: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 358. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1017.

翅展 45 mm。头部紫灰褐色，雄蛾触角线形，复眼后下方有一黄白斑，下唇须外侧大部黑色；胸部背面紫灰褐色，足黑褐色杂有少许灰白色，前足胫节外侧有二黄白斑，胫节端部黄白色，中、后足胫节距及各跗节有明显白斑；前翅淡紫灰色，基部及外区色稍紫，前缘区近基部有一小黑斑，内线为一向后渐宽的黑棕色带，其内缘凹，在中室处稍间断，环纹只现一黑点，中线双线黑棕色，波浪形，自中室至翅后缘，肾纹界限不清，约呈新月形，后端灰白色，外方有一略呈三角形的黑棕色斑，其后端内钩绕过肾纹，斑前方有较宽黑棕色，前缘脉上有几个黑斑，亚端线黑棕色，锯齿形，其中段外侧微带暗褐色；后翅淡褐色，端区色暗，近臀角有一锯齿形白纹，顶角外的缘毛间有白色，臀角外的缘毛白色；腹部淡褐灰色，腹两侧各有一列黄白斑，腹面褐灰色。

分布 广西、云南；印度尼西亚。

黑斑盾夜蛾 *Athyra chinensis* (Warren) (图版 LX-24)

Hypaetra chinensis Warren, 1907, in Seitz, Macrolep. World 3: 377, pl. 69c. (中国)

Anereuthina chinensis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 142, pl. 14, fig. 275.

翅展 46 mm 左右。头部与胸部暗褐色，雄蛾触角双栉形，触角基部杂赭黄色，足跗节有赭黄色斑；前翅淡褐灰色带有淡紫色调，中线与外线间带红棕色，基线为二黑小斑，位于中室前后，前一斑较大，近三角形，内线自前缘脉至中脉为一外斜黑条，其后为一近三角形大黑斑，其边缘稍曲，均衬白色，内线内侧在中室处衬紫褐色，环纹为一黑点，中线红棕色，不规则波浪形，内线与中线间赭白色，中室下角有一黑点，中线前端外方有一近方形小黑斑，外线黑色，起自 8 脉，中段膨大成一孟形大黑斑，在 2—4 脉间缩成内突钩形，大斑内侧衬白色，在 2 脉后为波曲黑线，外侧在 3 脉后带红棕色，亚端线黑色，间断为不整齐锯齿形，亚端区前缘脉上有四个赭黄点，端区带有黑褐色，端线赭黄色，内侧衬黑褐色，缘毛黑褐色；后翅暗褐色，亚端线隐约可见；腹部灰褐色。

分布 江西。

甸夜蛾属 *Eurogramma* Hampson

Eurogramma Hampson, 1926, Descr. New Gen. & Spec. Noct. Br. Mus. p. 498.

Type-species: *Talapa obliquilineata* Leech.