

分布 湖南、浙江；日本。

棘纬夜蛾 *Atrachea parvispina* (Tschetverikov) (图版 XXIX-2)

Ammoconia parvispina Tschetverikov, 1904, Rev. russ. ent. 4; 78. (Sojotrum Kemtchik)

Orthosia parvispina: Corti & Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 88.

Atrachea parvispina: Varga, 1982, Folia ent. Hung. 43 (1): 214.

Mesogona parvispina: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.156.

翅展 43mm。头部及胸部褐色杂灰色；前翅灰褐色，基线双线黑色，线间白色，二曲形达 1 脉，内线双线黑色，波曲外斜，内一线弱，剑纹只现黑边，环纹斜，近方形，褐白色，黑边，肾纹大，色似球纹，外线黑色，强锯齿形，后半内斜，亚端线不清晰，锯齿形内斜，端线黑色锯齿形；后翅灰褐色，腹部褐灰色。

分布 西藏；俄罗斯。

陌夜蛾属 *Trachea* Ochsenheimer

Trachea Ochsenheimer, 1816, Schmett, Eur. 4: 75.

Type-species: *Phalaena atriplicis* Linnaeus.

Achatis Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Bllbg. p. 87.

喙发达，额平滑，下唇须向上伸，第二节达额中部，第三节短钝，复眼大，无毛；头部与胸部主要被鳞片，前后胸有分裂形毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面有一列毛簇；前翅近三角形，外缘微锯齿形，有一副室。

种 检 索 表

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. 雄蛾触角锯齿形 | 2 |
| 雄蛾触角线形 | 4 |
| 2. 前翅中区有白曲带 | 美陌夜蛾 <i>Trachea bella</i> |
| 前翅中区无白曲带 | 3 |
| 3. 后翅白色带褐 | 矛陌夜蛾 <i>T. hastata</i> |
| 后翅暗褐色 | 铜色陌夜蛾 <i>T. stoliczkae</i> |
| 4. 前翅中室后有白斑 | 5 |
| 中室后无白斑 | 8 |
| 5. 白斑长大 | 陌夜蛾 <i>T. atriplicis</i> |
| 白斑小 | 6 |
| 6. 白斑长点形 | 白点陌夜蛾 <i>T. microspila</i> |
| 白斑非长点形 | 7 |