

Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1016.

翅展 28 mm。头部与胸部灰褐色，下胸与足色浅；前翅灰色微带褐色，内半部密布褐色细点，外区带有红棕色，翅脉白色，端区大部浅灰色，内线褐色，两侧衬白色，较直，中线褐色，微曲内弯，中线与外线之间巧克力色，外线灰白色，自前缘脉外斜至 4 脉折向内弯，后端与中线接近，顶角有一内斜二齿形黑棕色斑，其内侧模糊并向内扩展，端线暗褐色，波浪形，端区各翅脉间有一黑点；后翅褐色带灰色，端线暗褐色，波浪形，各翅脉间有一黑点，缘毛浅灰色；腹部灰褐色。

分布 河北、湖北、湖南、福建；日本，朝鲜。

颠夜蛾属 *Attatha* Moore

Attatha Moore, 1878, Proc. zool. Soc. Lond. p. 847.

Type-species: *Hypercompa regalis* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角稍扁，线形，后胸有一对毛簇，中、后足胫节具刺，后足胫节刺仅在中、端距之间；前翅有一副室；后翅中室稍短，长约为翅之 1/3，5 脉发达，自中室下角发出。

颠夜蛾 *Attatha regalis* (Moore) (图版LIV-16)

Hypercompa regalis Moore, 1872, Proc. zool. Soc. Lond. p. 575, pl. 33, fig. 7. (印度北部)

Trigonodes regalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 528.

Attatha regalis: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 8, text fig. 8. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357.

翅展 45 mm。头部乳黄色，触角与额黑色，下唇须绯红色，第二节端部及第三节黑色；胸部背面乳黄色，颈板上半部黑色，翅基片中部有一黑斑，中、后胸各有一黑斑，下胸红色，足橘黄色，中、后足前缘黑褐色；前翅乳黄色，前缘脉基部黑色，亚中褶基部有一黑条，其前缘达中室后缘，外缘钝圆，翅后缘有一黑色纵条，自近基部伸至外区，前缘脉中部至近臀角有一外斜黑带，前宽后窄，其内缘较直，外缘内曲弧形，后端斜削，外侧有一细弱褐线自前缘脉后斜伸至 2 脉前近达翅外缘，其后波浪形后垂至翅后缘，其上有一黑小斑，位于 1 脉处，前缘脉端 1/3 处有一黑色近三角形大斑，其后端尖，伸达 2 脉近端部，其内缘直，外缘中部稍凹，后方有一小黑斑，端线黑色，后半膨大为点状，臀角绯红；后翅绯红色，亚端区在亚中褶处有一黑斑，翅外缘内侧有一列小黑斑，翅外缘 2、3、4 脉上各有一黑点；腹部橘黄色，背面基部毛簇黑色，腹面带有绯红色。

寄主 鹊肾树属。

分布 广东、海南、云南；印度，斯里兰卡，缅甸，菲律宾。

象夜蛾属 *Grammodes* Guenée

Grammodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 275.

Type-species: *Noctua geometrica* Fabricius.

Prodotis John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 622.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节前方饰鳞片，额平滑，上有毛簇；复眼圆大，胸被毛杂有鳞片，无毛簇，前足胫节无刺，中后足胫节具刺，腹平滑；前翅外缘曲度平稳，微呈锯齿形，后翅中室约为翅长的1/3。

种 检 索 表

前翅内线、外线间黑色，后翅2脉端部一白斑 曲线象夜蛾 *Grammodes stolidus*
前翅内线、外线间黑色不达前缘区，后翅2脉端无白斑 象夜蛾 *G. geometrica*

曲线象夜蛾 *Grammodes stolidus* (Fabricius) (图版LIV-17)

Noctua stolidus Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 599. (India Orientali)

Grammodes stolidus: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 21. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 331.

Chalciope stolidus: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357.

翅展33 mm。头、胸、腹及前翅暗灰褐色；前翅中部一浅黄带，内侧一斜三角形黑斑，外线浅黄色，在6脉处折角内斜，后端与中带相遇，中带与外线间黑褐色，外线外侧一茶褐色带，外侧有黑齿纹，顶角一黑斜纹，内侧黑褐色，外侧微白，端区中段色较黑；后翅黑棕色，中带黄白色，前宽后窄，近臀角一黄白圆斑。

寄主 栎、悬钩子、马甲子等。

分布 福建、四川、云南；印度，缅甸，亚洲西部，欧洲，非洲。

象夜蛾 *Grammodes geometrica* (Fabricius) (图版LIV-18)

Noctua geometrica Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 599. (India Orientali)

Grammodes geometrica: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 331. —John, 1910, Hor. Soc. ent. ross, 39: 626.

Chalciope geometrica: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357.

翅展39—41 mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，前翅中部一黄色带，内侧有近三角形内斜斑，外侧一斜长方形黑斑，外线褐色带状，外侧有黑齿纹，顶角一黑色双齿形斑；后翅灰棕色，中带白色椎形，亚端线微白。雄蛾左右抱器瓣异形，右瓣腹端成钝圆